

Matrix Soortinformatie

Deze matrix laat zien of het om een vogel, zoogdier, een ander diersoort dan een vogel of zoogdier, of een plant gaat. Ook wordt beschreven voor welk leefgebied een soort een voorkeur heeft en wordt een advies gegeven hoe het beste rekening kan worden gehouden met een soort. Een voorbeeld van het laatste is om de werkzaamheid buiten het broedseizoen te plannen.

naam	omschrijving	leefgebied	advies voor deze soort
Aalscholver	Vogel	De aalscholver leeft in de buurt van water met (veel) vis. Aalscholvers broeden in kolonies, meestal bouwen ze hun nesten in bomen maar soms ook op de grond. De aalscholver bouwt zijn nest bij voorkeur op eilandjes.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de aalscholver is dat van januari (soms eind december) tot en met september. Dan zijn nesten beschermd. In Drenthe en Friesland gelden uitzonderingen; daar zijn de nesten van de aalscholver jaarrond beschermd. Haal nesten van de aalscholver in Drenthe en Friesland nooit weg.
Aardbeivlinder	Andere diersoort dan vogels of zoogdieren	De aardbeivlinder is een vlinder en leeft in structuurrijke lage bloemrijke graslanden, zowel op de heide als in de duinen en laagveengebieden. De rupsen leven vooral op tormentil of in de duinen op dauwbraam.	Houd bij werkzaamheden rekening met het behoud van het leefgebied van de aardbeivlinder.
Aardmuis	Zoogdier	De aardmuis leeft in allerlei soorten gebieden. Bijvoorbeeld in grasland waar het gras lang is en veel kruiden staan, verwilderde akkers en jonge bosaanplant.	In alle provincies geldt voor de aardmuis het hele jaar een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling. Niettemin geldt de zorgplicht. Houdt bij werkzaamheden rekening met het behoud van het leefgebied van de aardmuis, bijvoorbeeld door te zorgen voor ruig terrein met veel kruiden.
Adder	Andere diersoort dan vogels of zoogdieren	De adder is een reptiel en leeft vooral op heide en in het hoogveen, maar komt ook voor in (open) bos en stuikgewas en langs spoor- en wegbermen. Tussen half oktober en eind februari houden adders een winterslaap. Daarvoor kruipen ze bij elkaar.	Vermijd werkzaamheden in de voortplantingsperiode en tijdens de winterslaap. Voor de adder betekent dit dat werkzaamheden het beste kunnen worden uitgevoerd in het najaar. Plan de werkzaamheden in het najaar voor begin oktober, dan zijn de jongen geboren en is de winterslaap nog niet begonnen. In veel gebieden zijn de overwinteringsplekken onvoldoende bekend. Houd bij werkzaamheden rekening met het behoud van greppels, hellingen en overgangen van nat naar droog in het leefgebied van de adder. Vermijd bij werkzaamheden de inzet van groot materieel en grijp alleen kleinschalig in.

Akkerboterbloem	Plant	De akkerboterbloem groeit op akkers met veel leem en kalk in de grond. Je ziet ze vooral nadat er wintergraan is verbouwd. Soms groeit de akkerboterbloem in moestuinen en op omgespitte grond en braakliggende terreinen.	Voer zo min mogelijk werkzaamheden uit, bijvoorbeeld door niet te maaien, als de akkerboterbloem bloeit. Deze periode loopt van april tot en met juni. Voer werkzaamheden in de bodem bij voorkeur uit als de zaden rijp zijn. Voor de akkerboterbloem begint deze periode meestal in augustus. Hierdoor kunnen nieuwe planten makkelijker kiemen.
Akkerdoornzaad	Plant	Akkerdoornzaad groeit in akkers met graan, op zee- en rivierdijken en puinhellingen en langs rivieroeveren.	Voer zo min mogelijk werkzaamheden uit, bijvoorbeeld door niet te maaien, als akkerdoornzaad bloeit. Deze periode loopt van juni tot en met september. Voer werkzaamheden in de bodem bij voorkeur uit als de zaden rijp zijn. Voor akkerdoornzaad begint deze periode meestal in oktober. Hierdoor kunnen nieuwe planten makkelijker kiemen.
Akkerogentroost	Plant	Akkerogentroost groeit in akkerranden en akkers met graan.	Voer zo min mogelijk werkzaamheden uit, bijvoorbeeld door niet te maaien, als akkerogentroost bloeit. Deze periode loopt van mei tot en met augustus. Voer werkzaamheden in de bodem bij voorkeur uit als de zaden rijp zijn. Voor akkerogentroost begint deze periode meestal in september. Hierdoor kunnen nieuwe planten makkelijker kiemen.
Alpenwatersalamander	Andere diersoort dan vogels of zoogdieren	De alpenwatersalamander is een amfibie en leeft onder andere in bospoelen, vennen, sloten en tuinvijvers. De winterslaap begint ongeveer half oktober en eindigt rond eind februari. De meeste alpenwatersalamander overwinteren op het land.	Vermijd werkzaamheden in de voortplantingsperiode (water) en tijdens de winterrust (land). Voor alpenwatersalamanders betekent dit dat werkzaamheden in en nabij het water het beste kunnen worden uitgevoerd in de periode van 1 augustus tot en met 15 oktober. Werkzaamheden op het land worden bij voorkeur niet tussen half oktober en eind februari uitgevoerd. Houd bij werkzaamheden rekening met het behoud van het leefgebied van de alpenwatersalamander. Bijvoorbeeld door te zorgen voor houtstronken of houtstapels om onder te overwinteren.
Appelvink	Vogel	De appelvink leeft en broedt vooral in bossen, parken en tuinen met veel struiken en bomen.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de appelvink is dat van april tot en met augustus. Dan zijn nesten beschermd.

Athripsodes albifrons	Andere diersoort dan vogels of zoogdieren	Athripsodes albifrons is een insect en leeft in heuvellandbeken- en rivieren met een gevarieerde bedding van zand, grind, hout en organisch materiaal.	Voorkom waterverontreiniging en zorg voor ondergedoken zacht hout in de bedding van rivieren en beken in het gebied waar athripsodes albifrons leeft.
Baardman	Vogel	De baardman leeft en broedt in grote rietvelden. Ze hebben een voorkeur voor gebieden waar zowel oud als jong riet voorkomt.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de baardman is dat van half maart tot en met augustus. Dan zijn nesten beschermd.
Bastaardkikker	Andere diersoort dan vogels of zoogdieren	De bastaardkikker is een amfibie en leeft in schoon oppervlaktewater, variërend van zeer grote wateren (meren) tot kanalen, sloten, poelen en tuinvijvers. Bij voorkeur staan er veel planten langs de oever en in het water.	In alle provincies geldt het hele jaar een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling. Niettemin geldt de zorgplicht; zorg voor schoon oppervlaktewater met oevers met veel oeverplanten zodat de bastaardkikker kan schuilen. Van maart tot half oktober verblijft de bastaardkikker in of vlak bij het water. Laat daarom in deze periode, ook in het kader van de zorgplicht, bij baggeren de verwijderde modder en planten 24 uur op de oevers liggen zodat de bastaardkikkers eruit kunnen kruipen.
Beekprik	Andere diersoort dan vogels of zoogdieren	De beekprik is een vis en leeft in beken en riviertjes met een matige stroming en een goede waterkwaliteit. De larven laten zich na het uitkomen met de stroom meevoeren naar plekken met dood materiaal en slib en graven zich daar in.	Vermijd werkzaamheden in de voortplantings- en opgroeiperiode. Voor beekprikken betekent dit dat werkzaamheden het beste kunnen worden uitgevoerd van september t/m december. Dit is de periode waarin de jongste larven een aantal maanden oud zijn. Omdat de larven jaarrond opgroeien in de bodem kunnen baggerwerkzaamheden veel schade veroorzaken. Ze dienen daarom gefaseerd te worden uitgevoerd. In de bagger aanwezige larven moeten worden teruggezet. Zorg daarnaast voor een goede waterkwaliteit en herstel van (het natuurlijk verloop van) beken en riviertjes in het gebied waar de beekprik leeft.
Beekrombout	Andere diersoort dan vogels of zoogdieren	De beekrombout is een libelle en leeft in beken en kanalen met schoon water, veel stroming en een zandige bodem.	Houd bij de werkzaamheden rekening met het behoud van het leefgebied van de beekrombout.

Bergeend	Vogel	De bergeend leeft meestal in de buurt van zout of brak water. De bergeend broedt onder andere in (konijnen)holen, in verlaten gebouwen, in holtes van bomen en soms in dichte begroeiing.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de bergeend is dat van maart (soms eind februari) tot en met augustus (soms half september). Dan zijn nesten beschermd. In Drenthe en Friesland geldt een uitzondering. Hier mogen deze nesten nooit weggehaald worden, tenzij in de omgeving voldoende geschikte plekken zijn om een nieuw nest te bouwen. Om dat vast te stellen is vaak vooraf extra onderzoek nodig.
Bergnachtorchis	Plant	De bergnachtorchis groeit in loofbossen, graslanden en bermen en op dijken. De grond is kalkrijk, meestal vochtig en bevat weinig voedel.	Voer in het gebied waar bergnachtorchis voorkomt zo min mogelijk werkzaamheden uit. Bijvoorbeeld door het onderhoud te beperken. Maai bij voorkeur als de zaden zijn afgezet. Voor bergnachtorchis begint deze periode meestal in augustus.
Bever	Zoogdier	De bever leeft in rivieren, meren en andere wateren, waaronder die in bebouwd gebied. Het liefst leeft de bever in water omzoomd door bos met bomen als wilg en populier. Bevers zijn vooral in de schemering en 's nachts actief.	Vermijd werkzaamheden in de meeste kwetsbare periodes. Voor de bever zijn dit de voortplantingsperiode, die loopt van mei tot en met augustus, en de winterperiode op de momenten dat er ijs op het water ligt. Houd daarnaast bij werkzaamheden rekening met het behoud van de burcht, dit is de plek waar de bever rust en zich voortplant, en het gebied waar de bever leeft. Dit kan bijvoorbeeld door te zorgen voor voldoende bomen, een natte omgeving en rust in het leefgebied. Raadpleeg voor meer informatie het kennisdocument over deze soort op de website van BIJ12.
Bittervoorn	Andere diersoort dan vogels of zoogdieren	De bittervoorn is een vis met een voorkeur voor stilstaand of langzaam stromend water met plantenrijke oevers. De bittervoorn komt vooral voor in vaarten, bredere sloten en in uiterwaarden.	Vermijd werkzaamheden in de voortplantings- en opgroeiperiode. Voor bittervoorns betekent dit dat werkzaamheden het beste kunnen worden uitgevoerd in de periode van september tot en met februari. Voorkom het intensief baggeren en het schoonmaken van sloten in het gebied waar de bittervoorn leeft. Hierdoor blijven waterplanten behouden.
Blaasvaren	Plant	De blaasvaren groeit vooral op oude vochtige muren. Daarnaast komt de blaasvaren voor in waterputten en op hellingen met rotsen of bossen.	Voorkom beschadiging van de blaasvaren bij het herstellen van muren en gebruik zacht, kalkrijk materiaal om muren te voegen. Hiermee wordt (her-)vestiging van de blaasvaren bevorderd.

Blauw guichelheil	Plant	Blauw guichelheil groeit op open plekken in akkers met graan, in moestuinen en op omgespitte grond en braakliggend terreinen. De grond is meestal vochtig en er zit veel kalk in.	Voer zo min mogelijk werkzaamheden uit, bijvoorbeeld door niet te maaien, als blauw guichelheil bloeit. Deze periode loopt van mei tot en met oktober. Voer werkzaamheden in de bodem bij voorkeur uit als de zaden rijp zijn. Voor blauw guichelheil begint deze periode meestal ook in oktober. Hierdoor kunnen nieuwe planten makkelijker kiemen.
Blauwborst	Vogel	De blauwborst leeft en broedt in gebieden waar het nat is, veel struiken en bomen zoals wilgen, vlier en berken staan, riet groeit en sloten met veel planten zijn.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de blauwborst is dat van april tot en met juni. Dan zijn nesten beschermd.
Blauwe kiekendief	Vogel	De blauwe kiekendief leeft en broedt onder andere in duinen en moerassen en soms ook op akkers. De blauwe kiekendief jaagt soms boven grasland.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de blauwe kiekendief is dat van begin april tot eind augustus. Dan zijn nesten beschermd. In Friesland geldt een uitzondering. Hier mogen deze nesten nooit weggehaald worden, tenzij in de omgeving voldoende geschikte plekken zijn om een nieuw nest te bouwen. Om dat vast te stellen is vaak vooraf extra onderzoek nodig.
Blauwe reiger	Vogel	De blauwe reiger leeft in gebieden met ondiep water. Om te kunnen eten moeten er vissen, amfibieën, insecten, etc. voorkomen. De blauwe reiger broedt in kolonies. Dat kan in hoge bomen in een bosje of een park, maar ook in struiken in moerassen.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de blauwe reiger is dat van half januari tot eind augustus. In Drenthe en Friesland zijn nesten jaarrond beschermd. In de andere provincies ook, maar mogelijk zijn er uitzonderingen. Kijk voor de regels over jaarrond beschermde nesten in de Omgevingsverordening van de provincie.
Blauwzwarte houtbij	Andere diersoort dan vogels of zoogdieren	De blauwzwarte houtbij is een insect en leeft in tuinen, parken, oude hoogstamboomgaarden en bosranden in een bloemrijke (stedelijke) omgeving.	Behoud nestplaatsen door door zon beschienen dode bomen en dood hout in levende bomen niet weg te halen in het gebied waar de blauwzwarte houtbij leeft. Maai gefaseerd en zo laat mogelijk.

Boerenzwaluw	Vogel	De boerenzwaluw leeft op het boerenland, vaak in de buurt van water en vangt zijn voedsel in de lucht. Het voedsel bestaat uit enorme hoeveelheden kleine vliegende insecten. De boerenzwaluw broedt o.a. in boerenschuren, in loodsen en onder bruggen.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de boerenzwaluw is dat van begin april (soms eind maart) tot half september (soms eind september). In Flevoland, Limburg en Overijssel zijn nesten jaarrond beschermd. In andere provincies ook, tenzij in de omgeving voldoende geschikte plekken zijn om een nieuw nest te bouwen. Om dat vast te stellen is vaak vooraf extra onderzoek nodig. Kijk voor de regels over jaarrond beschermde nesten in de Omgevingsverordening van de provincie.
Bokkenorchis	Plant	De bokkenorchis groeit vooral in bermen en graslanden en op dijken met veel kalk in de grond. Ook groeit de bokkenorchis in bosranden, tussen struiken en in de duinen.	Voer in het gebied waar de bokkenorchis voorkomt zo min mogelijk werkzaamheden uit. Bijvoorbeeld door het onderhoud te beperken. Maai bij voorkeur nadat de zaden zijn afgezet en voordat de rozetten uitkomen. Voor de bokkenorchis begint deze periode vaak begin september.
Bontbekplevier	Vogel	De bontbekplevier leeft op zandplaten, stranden, natte akkers (vaak met schelpen) en graslanden met plassen. De meeste bontbekplevieren broeden in kustgebieden maar soms broeden ze ook in het binnenland in natte gebieden met weinig begroeiing.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de bontbekplevier is dat van half maart (soms begin maart) tot half augustus (soms eind augustus). Dan zijn nesten beschermd. In Friesland geldt een uitzondering. Hier mogen deze nesten nooit weggehaald worden, tenzij in de omgeving voldoende geschikte plekken zijn om een nieuw nest te bouwen. Om dat vast te stellen is vaak vooraf extra onderzoek nodig.
Bonte strandloper	Vogel	De bonte strandloper leeft vooral op zandplaten in kustgebieden, maar komt ook voor op weilanden met plassen. De bonte strandloper broedt in natte gebieden met weinig begroeiing, vaak in de buurt van zandplaten die niet onder water lopen.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de bonte strandloper is dat van half april (soms begin april) tot half augustus. Dan zijn nesten beschermd.

Bonte vliegenvanger	Vogel	De bonte vliegenvanger leeft vooral in bossen met verschillende soorten bomen, in tuinen en in boomgaarden. Vaak is er water in de buurt. De bonte vliegenvanger broedt in nestkasten en boomholtes.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de bonte vliegenvanger is dat van april tot eind juli. Dan zijn nesten beschermd. De bonte vliegenvanger broedt vaak op hetzelfde nest. In Overijssel, Noord-Brabant, Zuid-Holland, Noord-Holland, Zeeland, Gelderland en Utrecht geldt daarom een uitzondering. Hier mogen deze nesten nooit weggehaald worden, tenzij in de omgeving voldoende geschikte plekken zijn om een nieuw nest te bouwen. Om dat vast te stellen is vaak vooraf extra onderzoek nodig.
Boombewonende vleermuizen	Zoogdier	Boombewonende vleermuizen leven in bossen, bosranden, lanen en parken. Ze verblijven daar in boomholtes, in scheuren in bomen en ruimten achter bast. Voorbeelden zijn de rosse vleermuis en de watervleermuis.	De holtes en spleten waar boombewonende vleermuizen in leven zijn beschermd. Laat daarom in het leefgebied van boombewonende vleermuizen bomen staan. Hetzelfde geldt voor bossen, bosranden, lanen en parken omdat ze dienen als vliegrouwe en jachtterrein. Voorkom daarnaast het verlichten van de bomen en het leefgebied.
Boomkikker	Andere diersoort dan vogels of zoogdieren	De boomkikker is een amfibie en leeft in poelen, vennen en sloten met veel planten langs de oever en in het water. Overdag zonnen ze graag op braamstruiken die vlak bij het water staan. Vanaf half oktober tot begin april houden ze hun winterslaap.	Vermijd werkzaamheden in de kwetsbare periodes. Voor de boomkikker zijn dit de voortplantingsperiode en de winterslaap. Dit betekent dat werkzaamheden het beste kunnen worden uitgevoerd in de periode van 1 augustus tot en met 15 oktober. Houd bij werkzaamheden rekening met het behoud van het leefgebied van de boomkikker. Bijvoorbeeld door braamstruwelen, waar de boomkikker graag op zont, te laten staan.
Boomklever	Vogel	De boomklever leeft vooral in oudere bossen met loofbomen maar ook in tuinen en parken komen ze voor. Boomklevers broeden vaak in oude spechtnesten, soms broeden ze ook in nestkastjes.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de boomklever is dat van half maart (soms begin maart) tot en met eind juni. Dan zijn nesten beschermd. De boomklever broedt vaak op hetzelfde nest. In Overijssel, Noord-Brabant, Zuid-Holland, Noord-Holland, Zeeland, Gelderland en Utrecht geldt daarom een uitzondering. Hier mogen deze nesten nooit weggehaald worden, tenzij in de omgeving voldoende geschikte plekken zijn om een nieuw nest te bouwen. Om dat vast te stellen is vaak vooraf extra onderzoek nodig.

Boomkruiper	Vogel	De boomkruiper leeft onder andere in bossen, parken, boomgaarden, tuinen en bomenrijen. Boomkruipers maken nesten achter loszittende boombast, in spleten in bomen, in oude nestkastjes, tussen klimopbegroeiing en op veel andere plekken.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de boomkruiper is dat van begin maart tot begin juli (soms half juli). Dan zijn nesten beschermd. De boomkruiper broedt vaak op hetzelfde nest. In Overijssel, Noord-Brabant, Zuid-Holland, Noord-Holland, Zeeland, Gelderland en Utrecht geldt daarom een uitzondering. Hier mogen deze nesten nooit weggehaald worden, tenzij in de omgeving voldoende geschikte plekken zijn om een nieuw nest te bouwen. Om dat vast te stellen is vaak vooraf extra onderzoek nodig.
Boomleeuwerik	Vogel	De boomleeuwerik leeft en broedt in gebieden met zand, zoals duinen en hogere zandgronden met weinig begroeiing en hier en daar een boom. Dan moet je denken aan heideterreinen, kaalgekapt bospercelen, stuifzanden en zanderige akkers.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de boomleeuwerik is dat van half maart (soms begin maart) tot half september. Dan zijn nesten beschermd.
Boommarter	Zoogdier	De boommarter leeft meestal in het bos. Om te rusten verblijven ze vaak in boomholten, konijnenholten, tussen boomwortels of onder takkenbossen. Boommarters zijn vooral in de schemering en 's nachts actief.	Vermijd werkzaamheden in de kwetsbare periode. Voor de boommarter is dit de voorplantingsperiode. Deze begint als de jongen in maart worden geboren en eindigt in september als de jongen zelfstandig zijn. Houd daarnaast bij werkzaamheden rekening met het behoud van het leefgebied van de boommarter, bijvoorbeeld door holtes in bomen, konijnen-, vossen- en dassenholen niet te verwijderen.
Boompieper	Vogel	De boompieper leeft en broedt graag aan de rand van bossen, maar ook op kaalgekapt bospercelen en heideterreinen.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de boompieper is dat van half april tot eind augustus. Dan zijn nesten beschermd.
Boomvalk	Vogel	De boomvalk leeft in open gebied, bij voorkeur in de buurt van water, bomen en een bosrand. De boomvalk broedt onder andere in oude nesten, vaak zijn die van van kraaien geweest, in bomen en soms in hoogspanningsmasten.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de boomvalk is dat van mei tot eind september (soms tot half oktober). De boomvalk komt ieder jaar terug naar hetzelfde nest. Daarom zijn de nesten jaarrond beschermd. Haal nesten van de boomvalk nooit weg. In Flevoland geldt een uitzondering. Hier mogen deze nesten nooit weggehaald worden, tenzij in de omgeving voldoende geschikte plekken zijn voor een nieuw nest. Om dat vast te stellen is vaak vooraf extra onderzoek nodig.

Bosbeekjuffer	Andere diersoort dan vogels of zoogdieren	De bosbeekjuffer is een insect en leeft in zuurstofrijke beekjes met schaduw.	Zorg voor voldoende schaduw, bijvoorbeeld door bomen, langs de beekjes waarin de bosbeekjuffer leeft.
Bosmuis	Zoogdier	De bosmuis leeft zowel in bossen als open terreinen, zolang ze zich maar kunnen verstoppen. Ze komen o.a. voor in duinen, heide, akkers, wegbermen, tuinen en parken. Bosmuizen zijn vooral 's nachts actief.	In alle provincies geldt voor de bosmuis het hele jaar een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling. Niettemin geldt de zorgplicht. Zorg daarom voor plekken waar de bosmuis zich kan verstoppen, bijvoorbeeld door lage struiken aan te planten of stenen verspreid neer te leggen in het gebied waar de bosmuis leeft.
Bosparelmoervlinder	Andere diersoort dan vogels of zoogdieren	De bosparelmoervlinder is een vlinder en leeft op de overgang tussen bos en heide.	Houd bij werkzaamheden rekening met het behoud van het leefgebied van de bosparelmoervlinder.
Bosrietzanger	Vogel	De bosrietzanger leeft en broedt in vochtige gebieden met onder andere veel riet, brandnetels, wilgenroosjes en wilgenbosjes.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de bosrietzanger is dat van mei tot half augustus. Dan zijn nesten beschermd.
Bosuil	Vogel	De bosuil leeft vooral in open loofbos of gemengd bos maar ook in groene woonwijken met oude bomen en grote binnentuincomplexen komen ze voor. De bosuil broedt in holttes of andere openingen in oude bomen en soms in nestkasten.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de bosuil is dat van half januari tot eind juli. De bosuil komt ieder jaar terug naar hetzelfde nest. In Flevoland, Limburg, Overijssel, Drenthe en Friesland zijn nesten daarom jaarrond beschermd. In de andere provincies ook, tenzij in de omgeving voldoende geschikte plekken zijn om een nieuw nest te bouwen. Om dat vast te stellen is vaak vooraf extra onderzoek nodig. Kijk voor de regels over jaarrond beschermde nesten in de Omgevingsverordening van de provincie.
Boswitje	Andere diersoort dan vogels of zoogdieren	Het boswitje is een vlinder en leeft in zonnige kruidenrijke bosranden.	Voorkom het verlies van leefgebied. Het dichtgroeien van bosranden of het kappen van de bomen is funest voor boswitjes.
Braamsluiper	Vogel	De braamsluiper leeft en broedt vooral in duingebieden met doornstruiken en in kleinschalig boerenland met veel heggen maar ook in steden in parken en tuinen komen ze voor.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de braamsluiper is dat van half april (soms begin april) tot eind augustus. Dan zijn nesten beschermd.
Brachycentrus subnubilus	Andere diersoort dan vogels of zoogdieren	Brachycentrus subnubilus is een insect en leeft in schoon, stromend water vaak op hout of ondergedoken vegetatie. De larven zijn als filteraars afhankelijk van voorbijstromend voedsel.	Zorg voor een goede waterkwaliteit in het gebied waar brachycentrus subnubilus leeft.

Brandgans	Vogel	De brandgans leeft in gebieden met open water en grasland. De brandgans broedt vooral op eilandjes en in het riet.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de brandgans is dat van april tot half augustus. Dan zijn nesten beschermd.
Brave hendrik	Plant	De brave hendrik groeit vooral op omgewerkte grond die met organisch materiaal is bemest. Bijvoorbeeld rond mesthopen en beerputten bij boerderijen, op begraafplaatsen en in bermen.	Voer in het gebied waar de brave hendrik voorkomt zo min mogelijk werkzaamheden uit. Bijvoorbeeld door het onderhoud te beperken.
Brede wolfsmelk	Plant	Brede wolfsmelk groeit in akkers en akkerranden, op braakliggende grond en op open plekken met kleiige grond.	Voer zo min mogelijk werkzaamheden uit, bijvoorbeeld door niet te maaien, als brede wolfsmelk bloeit. Deze periode loopt van juni tot en met oktober. Voer werkzaamheden in de bodem bij voorkeur uit als de zaden rijp zijn. Voor brede wolfsmelk begint deze periode meestal ook in oktober. Hierdoor kunnen nieuwe planten makkelijker kiemen.
Brilduiker	Vogel	De brilduiker leeft buiten de broedtijd in waterpartijen dicht bij de kust die niet dieper zijn dan 10 meter. De brilduiker broedt in gebieden met bos en water, bijvoorbeeld bij rivieren.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de brilduiker is dat van half april tot half september. Dan zijn nesten beschermd. De brilduiker broedt vaak op hetzelfde nest of in de directe omgeving. In Noord-Brabant, Zuid-Holland, Noord-Holland, Zeeland, Gelderland en Utrecht geldt daarom een uitzondering. Hier mogen deze nesten nooit weggehaald worden, tenzij in de omgeving voldoende geschikte plekken zijn om een nieuw nest te bouwen. Om dat vast te stellen is vaak vooraf extra onderzoek nodig.
Bruin dikkopje	Andere diersoort dan vogels of zoogdieren	Het bruin dikkopje is een vlinder en leeft op kalkgraslanden met korte, kruidenrijke en kale plekjes.	Houd bij werkzaamheden met het behoud van het leefgebied van het bruin dikkopje.
Bruine eikenpage	Andere diersoort dan vogels of zoogdieren	De bruine eikenpage is een vlinder en leeft op heide, in duinen en bosranden waar kleine slecht groeiende eikjes (waardplanten) staan.	Laat kleine slecht groeiende eikjes staan en zorg dat er voldoende bloemen in de omgeving staan zodat de bruine eikenpage nectar kan vinden.
Bruine kiekendief	Vogel	De bruine kiekendief leeft vooral in moerassen waar veel riet staat maar ook op het boerenland. De bruine kiekendief broedt het liefst in grote gebieden met riet, maar ook in slotjes met riet en in akkerlanden komen ze voor.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de bruine kiekendief is dat van half maart tot eind augustus (soms half september). Dan zijn nesten beschermd.

Bruine kikker	Andere diersoort dan vogels of zoogdieren	De bruine kikker is een amfibie en leeft o.a. in sloten, poelen, vennen en tuin- en stadsvijvers. De soort leeft zowel in het water maar vaker nog op het land. De bruine kikker heeft een voorkeur voor water waar weinig of geen vis zit.	In alle provincies geldt het hele jaar een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling. Niettemin geldt de zorgplicht; zorg daarom voor kleine oppervlaktewateren met weinig of geen vis zodat de larven van de bruine kikker niet worden opgegeten. Een deel van de dieren verblijft ook na de voortplanting in of bij het water. Laat daarom, ook in het kader van de zorgplicht, bij baggeren verwijderde modder en planten 24 uur op de oevers liggen zodat de bruine kikkers eruit kunnen kruipen.
Bruinrode wespenorchis	Plant	De bruinrode wespenorchis groeit op grond waar veel kalk in zit. De plek waar de bruinrode wespenorchis groeit is meestal zonnig of er is lichte schaduw.	Voer in het gebied waar de bruinrode wespenorchis voorkomt zo min mogelijk werkzaamheden uit. Bijvoorbeeld door het onderhoud te beperken.
Buidelmees	Vogel	De buidelmees leeft vooral in moerassen. De buidelmees broedt in wilgen en berken langs plassen en rivieren.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de buidelmees is dat van begin april tot eind augustus. Dan zijn nesten beschermd.
Buizerd	Vogel	De buizerd leeft meestal in de rustige delen van het bos in de nabijheid van open land maar ook in kleine bosjes. Het open land wordt gebruikt om te jagen, het bos om een nest te bouwen. Het nest van de buizerd is groot en wordt gebouwd van takken.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de buizerd is dat van februari tot en met half (soms eind) augustus. De buizerd komt ieder jaar terug naar hetzelfde nest. Daarom zijn nesten jaarrond beschermd. In Limburg en Drenthe ook, tenzij in de omgeving voldoende geschikte plekken zijn om een nieuw nest te bouwen. Om dat vast te stellen is vaak vooraf extra onderzoek nodig. Raadpleeg voor meer informatie de Omgevingsverordening van de provincie en het kennisdocument over deze soort op de website van BIJ12.
Bunzing	Zoogdier	De bunzing leeft vooral in natte gebieden en boomgroepen. Ze houden minder van dichte bebossing en naaldbomen. Ook in dorpen en buitenwijken van steden komt de bunzing voor. Bunzingen zijn vooral 's nachts actief.	Vermijd werkzaamheden in de kwetsbare periode. Voor de bunzing is dit de voortplantingsperiode die loopt van begin maart tot eind september. Zorg voor voldoende voedsel en plekken om zich te kunnen verstoppen, bijvoorbeeld door muizen niet te bestrijden en hopen snoeimateriaal achter te laten. Voer werkzaamheden stap voor stap uit zodat altijd in een deel van het leefgebied rust is. In Limburg en Zuid-Holland geldt voor de bunzing een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling. Raadpleeg voor meer informatie het kennisdocument over deze soort op de website van BIJ12.

Ceraclea albimacula	Andere diersoort dan vogels of zoogdieren	Ceraclea albimacula is een insect en leeft in schone stromende laaglandrivieren, vaak in nabijheid van zoetwatersponzen	Zorg voor goede waterkwaliteit en voldoende structuren in het water in het gebied waar ceraclea albimacula leeft.
Cetti's Zanger	Vogel	De Cetti's zanger leeft en broedt in dicht struikgewas in de buurt van water en bij sloten met veel begroeiing.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de cetti's zanger is dat van half april (soms begin april) tot half augustus (soms eind augustus). Dan zijn nesten beschermd.
Damhert	Zoogdier	Het damhert leeft vooral in lichte loofbossen, gemengde bossen en duinen. Belangrijk is dat er voldoende kruidenrijk gras is.	Probeer damherten niet te verstoren waardoor ze plotseling de weg oversteken en er verkeersslachtoffers kunnen vallen. Houd bij werkzaamheden rekening met het behoud van het leefgebied van het damhert.
Das	Zoogdier	De das leeft in akker- en weidelandschappen. Dassen komen o.a. voor in open terreinen, cultuurlandschappen en rivierdalen met bosjes, heggen en houtwallen. Dassen zijn in de avond actief en gebruiken vaak vaste paden (wissels).	Vermijd werkzaamheden in de kwetsbare periode. Dit is voor de das de voortplantingsperiode. Deze begint bij de zwangerschap in december en eindigt begin juli als de jongen zelfstandig zijn. Voorkom blokkering van dassenwissels, met name rondom wegen, omdat daarmee het risico op verkeersslachtoffers toeneemt. De das gebruikt zijn/haar burchten en vluchtpijpen het hele jaar. Dit zijn de plekken waar de das rust en zich voortplant. Zorg daarom voor rust rond en behoud van de burchten en de vluchtpijpen. Raadpleeg voor meer informatie het kennisdocument over deze soort op de website van BIJ12.
Dennenorchis	Plant	Dennenorchis groeit vooral in dennenbossen met een dikke laag mos op de grond en weinig struiken.	Voer in het gebied waar dennenorchis voorkomt zo min mogelijk werkzaamheden uit. Bijvoorbeeld door het onderhoud te beperken. Voorkom veel begroeiing met struiken, bijvoorbeeld door de struiken kort bij de grond af te zagen of om te hakken.
Dodaars	Vogel	De dodaars leeft in allerlei gebieden met open water. De dodaars broedt onder andere in moerassen en bij vennen, plassen en kreken.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de dodaars is dat van maart tot half oktober. Dan zijn nesten beschermd.
Donker pimpernelblauwtje	Andere diersoort dan vogels of zoogdieren	Het donkere pimpernelblauwtje is een vlinder en leeft op grasland waar ook de grote pimpernel voorkomt.	Voorkom het verlies van grasland met de grote pimpernel. Maaien in de bloeitijd maakt het leefgebied ongeschikt voor het donker pimpernelblauwtje.

Donkere dubbeltand	Andere diersoort dan vogels of zoogdieren	De donkere dubbeltand is een insect en leeft op droge heide en in zandafgravingen.	De donkere dubbeltand parasiteert op de roodscheenzandbij, die stuifmeel verzamelt op bos- en knotwilgen. Laat daarom bos- en knotwilgen staan in het gebied waar de donkere dubbeltand leeft en knot gefaseerd.
Donkere waterjuffer	Andere diersoort dan vogels of zoogdieren	De donkere waterjuffer is een insect en leeft tussen sprieterige planten in het ondiepe water van petgaten (trekgaten) in het laagveenmoeras.	Houd bij de werkzaamheden rekening met het behoud van het leefgebied van de donkere waterjuffer.
Draaihals	Vogel	De draaihals leeft op bodems van zand waar weinig groeit, bijvoorbeeld open dennenbos, heides en stuifzand. De draaihals broedt in oude, meestal deels verrotte, loofbomen, soms in oud nestholtes van de grote bonte specht, maar ook wel in nestkasten.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de draaihals is dat van half april tot half september. In Drenthe en Friesland zijn nesten jaarrond beschermd. In de andere provincies ook, maar mogelijk zijn er uitzonderingen. Kijk voor de regels over jaarrond beschermde nesten in de Omgevingsverordening van de provincie.
Dreps	Plant	Dreps groeit vooral op akkers maar soms groeit ze ook op braakliggende grond en langs spoorwegen.	Voer zo min mogelijk werkzaamheden uit, bijvoorbeeld door niet te maaien, als dreps bloeit. Deze periode loopt van mei tot en met augustus. Voer werkzaamheden in de bodem bij voorkeur uit als de zaden rijp zijn. Voor dreps begint deze periode meestal in september. Hierdoor kunnen nieuwe planten makkelijker kiemen.
Drijvende waterweegbree	Plant	Drijvende waterweegbree groeit in beken, vennen, poelen en kanalen met helder water waar weinig voedsel in zit.	Voer zo min mogelijk werkzaamheden uit aan de watergang als drijvend waterweegbree zaad vormt. Deze periode loopt van juni tot en met september. Voorkom daarnaast dat, in het gebied waar drijvende waterweegbree voorkomt, er mest (fosfaat) in het water komt.
Duinparelmoervlinder	Andere diersoort dan vogels of zoogdieren	De duinparelmoervlinder is een vlinder en leeft in duingraslanden met viooltjes die afgewisseld worden met hogere vegetatie waar nectarplanten groeien.	Houd bij werkzaamheden rekening met het behoud van het leefgebied van de duinparelmoervlinder.
Dwergblauwtje	Andere diersoort dan vogels of zoogdieren	Het dwergblauwtje is een vlinder en leeft op kalkgraslanden en in groeves met wondklaver.	Houd bij werkzaamheden rekening met het behoud van het leefgebied van het dwergblauwtje.

Dwergmuis	Zoogdier	De dwergmuis leeft vooral in hoog gras, graan- en rietvelden, ruigten en dijkbegroeiing maar ook in kreupelhout, houtwallen, hagen, braamstruiken en duinen komt de dwergmuis voor.	In alle provincies geldt voor de dwergmuis het hele jaar een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling. Niettemin geldt de zorgplicht. Houd daarom bij werkzaamheden rekening met het behoud van het leefgebied van de dwergmuis, bijvoorbeeld door planten en struiken (hoog) te laten groeien en grasland weinig te maaien.
Dwergspitsmuis	Zoogdier	De dwergspitsmuis komt op veel plekken voor, zolang de bodem maar is bedekt met planten en het er vochtig en koel is. Voorbeelden van gebieden waar de dwergspitsmuis voorkomt zijn: graslanden, heggen, bermen, parken en tuinen.	In alle provincies geldt voor de dwergspitsmuis het hele jaar een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling. Niettemin geldt de zorgplicht. Houd daarom bij werkzaamheden rekening met het behoud van het leefgebied van de dwergspitsmuis, bijvoorbeeld door te zorgen dat de bodem bedekt is met planten zodat de dwergspitsmuis zich kan verstoppen en er voedsel kan vinden.
Edelhert	Zoogdier	Het edelhert leeft o.a. in bossen, moerassen en op graslanden en heidevelden. In de winter moet er gras en drinkwater in de buurt zijn.	De edelhertpopulaties worden in Nederland gereguleerd maar er geldt geen vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling. Houd bij werkzaamheden rekening met het behoud van het leefgebied van het edelhert.
Eekhoorn	Zoogdier	De eekhoorn leeft vooral in loofbos, naaldbos of gemengd bos. Ook in tuinen, parken en houtwallen in de buurt van bos komt de eekhoorn voor.	Behoud bomen in het gebied waar de eekhoorn leeft. De nesten van eekhoorns zijn beschermd. Dit betekent dat je ze niet mag beschadigen. In Limburg geldt een vrijstelling in maart, april en van juli tot en met november bij ruimtelijke ontwikkeling of bestendig beheer en onderhoud. Deze vrijstelling geldt niet voor het doden van eekhoorns. Kijk voor meer informatie in de Omgevingsverordening van de provincie.
Egel	Zoogdier	De egel komt op veel plekken voor zolang er maar groen en schuilplaatsen aanwezig zijn. Voorbeelden van gebieden waar egels voorkomen zijn: tuinen, parken, struiken, houtwallen en loofbossen.	Met uitzondering van Overijssel geldt voor de egel in alle provincies het hele jaar een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling. Niettemin geldt de zorgplicht. Houd daarom bij werkzaamheden rekening met het leefgebied van de egel, bijvoorbeeld door struiken aan te planten en bladerhopen te laten liggen zodat de egel zich kan verstoppen.

Eider	Vogel	De eider leeft vooral in zoutwater. De eider broedt meestal in de duinen maar soms ook op kwelders (buitendijks) of binnendijks, nabij zoutwater.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de eider is dat van half maart tot half augustus (soms eind augustus). Dan zijn nesten beschermd. De eider broedt vaak op hetzelfde nest of in de directe omgeving. In Friesland, Noord-Brabant, Zuid-Holland, Noord-Holland, Zeeland, Gelderland en Utrecht geldt daarom een uitzondering. Hier mogen deze nesten nooit weggehaald worden, tenzij in de omgeving voldoende geschikte plekken zijn om een nieuw nest te bouwen. Om dat vast te stellen is vaak vooraf extra onderzoek nodig.
Eikelmuis	Zoogdier	De eikelmuis leeft vooral in de struiken van hellingbossen op kalkrijke grond. Verder komen ze voor in boomgaarden en tuinen. Eikelmuisen gebruiken heggen en hagen om van de ene naar de andere plek te komen.	Voor de eikelmuis bestaat een beschermingsprogramma om het leefgebied te herstellen. Houd bij werkzaamheden rekening met het behoud van het leefgebied van de eikelmuis, bijvoorbeeld door heggen en hagen te laten staan in het gebied waar de eikelmuis leeft.
Ekster	Vogel	De ekster leeft en broedt graag in de buurt van mensen, bijvoorbeeld in tuinen, in stadsparken en op boerenerven met bomen.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de ekster is dat van half februari tot half juli. Dan zijn nesten beschermd. De ekster broedt vaak op hetzelfde nest of in de directe omgeving. In Noord-Brabant, Zuid-Holland, Noord-Holland, Zeeland, Gelderland en Utrecht geldt daarom een uitzondering. Hier mogen deze nesten nooit weggehaald worden, tenzij in de omgeving voldoende geschikte plekken zijn om een nieuw nest te bouwen. Om dat vast te stellen is vaak vooraf extra onderzoek nodig.
Elrits	Andere diersoort dan vogels of zoogdieren	De elrits is een vis en leeft vooral in matig tot snelstromende beken en rivieren met schoon water. In de winter verzamelen elritsen zich op plaatsen waar het water langzaam stroomt en verschuilen ze zich tussen stenen.	Vermijd werkzaamheden in de voortplantings- en opgroeiperiode. Voor de elrits betekent dit dat werkzaamheden het beste kunnen worden uitgevoerd in de periode van september tot en met februari. Verbeter de waterkwaliteit en zorg voor herstel van (het natuurlijk verloop van) beken en riviertjes in het gebied waar de elrits leeft.
Europese kanarie	Vogel	De Europese kanarie leeft en broedt in halfopen, aangelegd landschap, zoals parken, tuinen, boomgaarden en begraafplaatsen.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de Europese kanarie is dat van half april tot eind augustus. Dan zijn nesten beschermd.

Fint	Andere diersoort dan vogels of zoogdieren	De fint is een vis en leeft langs de Nederlandse kust en hiermee verbonden water zoals het IJsselmeer en de Nieuwe Waterweg. Het is een trekvis die in het zoute water van de zee leeft en zich voortplant in het zoete water van de rivieren.	Vermijd werkzaamheden in de voortplantings- en opgroeiperiode. Voor de fint betekent dit dat werkzaamheden het beste kunnen worden uitgevoerd in de periode van september tot en met februari. Houd bij werkzaamheden rekening met het behoud van het leefgebied van de fint. Bijvoorbeeld door te zorgen voor een, liefst open, verbinding met de zee.
Fitis	Vogel	De fitis leeft in struiken en bosjes, vaak groeien er jonge bomen of hogere struiken. Dit kan in natuurgebieden zijn zoals in duinen en bossen, maar ook in de bebouwde kom of langs wegen.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de fitis is dat van half april tot en met eind juli. Dan zijn nesten beschermd.
Fluiter	Vogel	De fluiter leeft en broedt bij voorkeur in beukenbossen maar ook in eiken- en gemengde bossen komen ze voor. Belangrijk is dat er jonge en oude bomen staan.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de fluiter is dat van half april tot eind juli. Dan zijn nesten beschermd.
Fuut	Vogel	De fuut leeft en broedt in de buurt van open water met (veel) vis. Het nest drijft op het water, maar zit vast aan waterplanten.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de fuut is dat van begin maart tot eind september (soms tot half oktober). Dan zijn nesten beschermd.
Gaai	Vogel	De gaai leeft en broedt in bossen, meestal met oude loofbomen, kleinschalig boerenland en in parken en tuinen in de stad.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de gaai is dat van april tot en met juli. Dan zijn nesten beschermd.
Gaffelibel	Andere diersoort dan vogels of zoogdieren	De gaffelibel is een libelle en leeft in beken en kleine rivieren. De larve leeft in de bodem en de volwassen libel vliegt in de omgeving van het water.	Zorg voor een goede waterkwaliteit in het gebied waar de gaffelibel leeft.

Gebouwbewonende vleermuizen	Zoogdier	Gebouwbewonende vleermuizen leven in alle typen landschappen. Deze vleermuizen verblijven in gebouwen, onder andere achter betimmering en daklijsten, in spouwmuuren, of onder dakpannen.	Spleten en openingen in gebouwen waarin vleermuizen leven, zijn beschermd. Voorkom het verlichten van gevels waarin vliegopeningen zitten en het dichtmaken van invliegopeningen en holle ruimtes in muren en daken. Behoud bomenrijen, bosjes en water omdat ze dienen als vliegroute en jachtterrein. Voor meer info over de gewone en de ruige dwergvleermuis of de gewone grootoorvleermuis: zie de kennisdocumenten op de website van BIJ12 en eventueel verderop in dit rapport. Let op! Dit sluit het voorkomen van andere vleermuissoorten niet uit. Check daarnaast ook altijd natuurvriendelijkisoleren.nl.
Geelbuikvuurpad	Andere diersoort dan vogels of zoogdieren	De geelbuikvuurpad is een amfibie. De voortplanting vindt plaats in tijdelijke ondiepe en onbegroeide watertjes zoals regenplassen en karrensporen. Het is een pioniersoort, dat betekent dat de soort zich vaak als eerste ergens vestigt.	Vermijd werkzaamheden in de voortplantingsperiode. Voor de geelbuikvuurpad betekent dit dat werkzaamheden in het water het beste kunnen worden uitgevoerd zodra deze zijn drooggefallen. Meestal is dit in de zomer of nazomer. Houd bij werkzaamheden rekening met het behoud van het leefgebied van de geelbuikvuurpad. Bijvoorbeeld door te zorgen voor kleine en ondiepe, tijdelijke watertjes.
Geelgors	Vogel	De geelgors leeft en broedt in open cultuurlandschappen waarin op meerdere plekken heggen en struiken staan, zoals heidevelden en kleinschalig boerenland.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de geelgors is dat van half maart tot half augustus. Dan zijn nesten beschermd.
Geelgroene wespenorchis	Plant	De geelgroene wespenorchis groeit in bosranden, tussen struiken en op kaalgekapt bospercelen op grond waar veel kalk in zit.	Voer in het gebied waar de geelgroene wespenorchis voorkomt zo min mogelijk werkzaamheden uit. Bijvoorbeeld door het onderhoud te beperken.
Geelsprietdikkopje	Andere diersoort dan vogels of zoogdieren	Het geelsprietdikkopje is een vlinder en leeft in ruige graslanden, vaak langs bosranden en op open plekken in bossen.	Maai gefaseerd zodat de rupsen van het geelsprietdikkopje in het hoge gras kunnen overwinteren.

Gekraagde roodstaart	Vogel	De gekraagde roodstaart leeft in open bos, in bosranden, op heidevelden met groepen bomen en kleinschalig boerenland. Gekraagde roodstaarten broeden onder andere in de holtes van (rotte) bomen, nestkasten en soms in een holletje in de grond.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de gekraagde roodstaart is dat van april tot eind juli. Dan zijn nesten beschermd. De gekraagde roodstaart broedt vaak op hetzelfde nest. In Friesland, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant, Zuid-Holland, Noord-Holland, Zeeland, Gelderland en Utrecht geldt daarom een uitzondering. Hier mogen deze nesten nooit weggehaald worden, tenzij in de omgeving voldoende geschikte plekken zijn om een nieuw nest te bouwen. Om dat vast te stellen is vaak vooraf extra onderzoek nodig.
Gele kwikstaart	Vogel	De gele kwikstaart leeft en broedt in allerlei soorten open gebieden, vooral op akkers, maar ook op (natte) weilanden, in moerasgebieden en langs rivieren.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de gele kwikstaart is dat van eind maart mei tot half juli (soms tot eind juli). Dan zijn nesten beschermd.
Gele tubebij	Andere diersoort dan vogels of zoogdieren	De gele tubebij is een insect en leeft op bloemrijke graslanden in de buurt van naaldbos.	Maai gefaseerd en zo laat mogelijk in het gebied waar de gele tubebij leeft.
Gentiaanblauwtje	Andere diersoort dan vogels of zoogdieren	Het gentiaanblauwtje is een vlinder en leeft in natte heidegebieden en blauwgraslanden waar klokjesgentianen groeien.	Houd bij werkzaamheden rekening met het behoud van het leefgebied van het gentiaanblauwtje.
Geoorde fuut	Vogel	De geoorde fuut leeft en broedt bij ondiep water met veel planten langs de oevers, zoals heidevennen en hoogveenplassen. Het nest drijft op het water en wordt tussen waterplanten gebouwd.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de geoorde fuut is dat van begin april tot eind september. Dan zijn nesten beschermd.
Gestreepte waterroofkever	Andere diersoort dan vogels of zoogdieren	De gestreepte waterroofkever is een insect en leeft in de buurt van heldere, matig voedselrijke, meestal grote en zonbeschenen wateren zonder kroosdek met natuurlijke oevers.	Zorg voor een goede waterkwaliteit en voorkom eutrofiëring en schaduw in een gebied waar de gestreepte waterroofkever leeft.
Getande veldsla	Plant	Getande veldsla groeit op akkers met veel kalk in de grond.	Voer zo min mogelijk werkzaamheden uit, bijvoorbeeld door niet te maaien, als getande veldsla bloeit. Deze periode loopt van mei tot en met augustus. Voer werkzaamheden in de bodem bij voorkeur uit als de zaden rijp zijn. Voor getande veldsla begint deze periode meestal in augustus. Hierdoor kunnen nieuwe planten makkelijker kiemen.

Gevlekte glanslibel	Andere diersoort dan vogels of zoogdieren	De gevlekte glanslibel is een libelle en leeft in matig voedselrijke moerassen. De voortplanting vindt plaats in ondiep water met veel begroeiing. De volwassen dieren jagen in de omgeving.	Houd bij werkzaamheden rekening met het behoud van het leefgebied van de gevlekte glanslibel.
Gevlekte witsnuitlibel	Andere diersoort dan vogels of zoogdieren	De gevlekte witsnuitlibel is een libelle en leeft in laagveengebieden en vennen met veel waterplanten.	Faseer en wees terughoudend met het schoonmaken van sloten in het gebied waar de gevlekte witsnuitlibel leeft.
Gewone bosspitsmuis	Zoogdier	De gewone bosspitsmuis leeft in allerlei soorten gebieden. Voorwaarde is wel dat de bodem helemaal is bedekt met ruige begroeiing.	In alle provincies geldt voor de gewone bosspitsmuis het hele jaar een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling. Niettemin geldt de zorgplicht. Plant daarom stuiken aan en zorg door ruige begroeiing die de bodem helemaal bedekt in het gebied waar de gewone bosspitsmuis leeft.
Gewone bronlibel	Andere diersoort dan vogels of zoogdieren	De gewone bronlibel is een libelle en leeft in kleine beekjes met zuurstofrijk water.	Houd bij de werkzaamheden rekening met het behoud van het leefgebied van de gewone bronlibel.
Gewone dwergvleermuis	Zoogdier	De gewone dwergvleermuis komt in de zomer in tuinen, parken en bossen voor. Overdag verblijven ze in gebouwen, vaak achter betimmering en daklijsten, in spouwmuren of onder dakpannen.	Dit gebouw kan door de gewone dwergvleermuis worden gebruikt als kraamverblijfplaats. Behoud open water, bomenrijen en bosschages en voorkom verlichting in het leefgebied. Raadpleeg voor meer informatie het kennisdocument over deze soort op de website van BIJ12. Let op! Het gebouw kan door de gewone dwergvleermuis ook voor andere functies dan kraamverblijfplaats worden gebruikt. Bovendien is niet uitgesloten dat er ook andere vleermuissoorten voorkomen in dit gebouw.
Gewone pad	Andere diersoort dan vogels of zoogdieren	De gewone pad is een amfibie en plant zich voort in poelen, vijvers, vennen, sloten en weteringen en zwak stromende beken. De gewone pad leeft buiten de voortplantingstijd (maart) vooral op het land.	In alle provincies geldt het hele jaar een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling. Niettemin geldt de zorgplicht; zorg daarom voor poelen, vijvers en sloten waarin de gewone pad zich kan voortplanten. Voorkom sterfte op wegen door in de paartijd, als de padden trekken, schermen te plaatsen en/of wegen tijdelijk af te sluiten.

Gierzwaluw	Vogel	De gierzwaluw leeft en broedt vooral in gebouwen en vangt zijn voedsel in de lucht. Het voedsel bestaat uit kleine insecten. De gierzwaluw broedt in spouwmuren, onder dakpannen, in spleten in muren, nestkasten/-stenen, zelden in boomholten.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de gierzwaluw is dat van eind april (soms half april) tot eind augustus (soms half september). De gierzwaluw broedt meestal in groepen variërend van tientallen nesten in één gebouw tot nesten verspreid in een complete woonwijk. De gierzwaluw is zeer honkvast en keert elk jaar terug naar dezelfde locatie. Daarom zijn de nesten jaarrond beschermd. Haal nesten van de gierzwaluw nooit weg. Raadpleeg voor meer informatie het kennisdocument over deze soort op de website van BIJ12.
Glad biggenkruid	Plant	Het glad biggenkruid groeit vooral in akkerranden, berm en zeeduin maar kan ook tussen straatstenen en in gazons voorkomen.	Voer zo min mogelijk werkzaamheden uit, bijvoorbeeld door niet te maaien, als glad biggenkruid bloeit. Deze periode loopt van mei tot en met augustus. Voer werkzaamheden in de bodem bij voorkeur uit als de zaden rijp zijn. Voor glad biggenkruid begint deze periode meestal in augustus. Hierdoor kunnen nieuwe planten makkelijker kiemen.
Gladde slang	Andere diersoort dan vogels of zoogdieren	De gladde slang is een reptiel en leeft in heide, open bos en hoogveen. Ze zijn overdag actief maar worden door de goede schutkleur en onopvallend gedrag zelden opgemerkt. In de wintermaanden houden gladde slangen een winterslaap.	Vermijd werkzaamheden in de voortplantingsperiode en tijdens de winterslaap. Voor de gladde slang betekent dit dat werkzaamheden het beste kunnen worden uitgevoerd in het najaar. Plan de werkzaamheden in het najaar voor begin oktober, dan zijn de jongen geboren en is de winterslaap nog niet begonnen. Houd bij werkzaamheden rekening met het leefgebied van de gladde slang. Bijvoorbeeld door geen grondwerkzaamheden uit te voeren.
Gladde zegge	Plant	De gladde zegge groeit langs beekjes in bossen met veel schaduw.	Voer in het gebied waar de gladde zegge voorkomt zo min mogelijk werkzaamheden uit. Bijvoorbeeld door het onderhoud te beperken.

Glanskop	Vogel	De glanskop leeft onder andere in bossen en parken met oudere bomen waar struiken onder groeien. De glanskop broedt in de holtes van loofbomen.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de glanskop is dat van half maart tot half juli. Dan zijn nesten beschermd. De glanskop broedt vaak op hetzelfde nest. In Overijssel, Drenthe, Friesland, Noord-Brabant, Zuid-Holland, Noord-Holland, Zeeland, Gelderland en Utrecht geldt daarom een uitzondering. Hier mogen de nesten nooit weggehaald worden, tenzij in de omgeving voldoende geschikte plekken zijn om een nieuw nest te bouwen. Om dat vast te stellen is vaak vooraf extra onderzoek nodig.
Goudhaan	Vogel	De goudhaan leeft en broedt in bossen en parken met naaldbomen, bij voorkeur in sparren.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de goudhaan is dat van april tot eind augustus. Dan zijn nesten beschermd.
Goudvink	Vogel	De goudvink leeft en broedt vooral in gebieden met bossen met naaldbomen, maar komt ook voor in grote tuinen, parken en boomgaarden.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de goudvink is dat van april tot en met augustus. Dan zijn nesten beschermd.
Grammotaulius nigropunctatus	Andere diersoort dan vogels of zoogdieren	Grammotaulius nigropunctatus is een insect en leeft in periodiek droogvallende poelen en nevengeulen met veel vegetatie.	Voorkom kunstmatig peilbeheer en kanalisatie waardoor het water waar grammotaulius nigropunctatus in leeft niet meer periodiek droogvalt.
Grammotaulius nitidus	Andere diersoort dan vogels of zoogdieren	Grammotaulius nitidus is een insect en leeft in langzaam stromend en stilstaand water met structuurrijke oevers om haar eitjes af te kunnen zetten. Grammotaulius nitidus heeft vermoedelijk een voorkeur voor periodiek droogvallende wateren.	Voorkom kunstmatig peilbeheer en kanalisatie waardoor het water waar grammotaulius nitidus in leeft niet meer periodiek droogvalt.
Grasmus	Vogel	De grasmus leeft en broedt in gebieden met veel begroeiing met verspreide bosjes of kleine boompjes, zoals duinen, tuinen, parken, bosranden en boerenland.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de grasmus is dat van half april tot eind juli. Dan zijn nesten beschermd.
Graspieper	Vogel	De graspieper leeft en broedt in open gebieden met veel lage begroeiing, zoals open duin, heide, graslanden en bouwlanden met veel sloten en dijkes.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de graspieper is dat van half maart tot half augustus. Dan zijn nesten beschermd.

Graszanger	Vogel	De graszanger leeft en broedt op vlakke terreinen zonder bomen maar wel met hoog gras, zegge of bies. Vaak is dit op schorren, dat zijn gebieden die overstromen bij springtij.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de graszanger is dat van half maart tot half september. Dan zijn nesten beschermd.
Grauwe gans	Vogel	De grauwe gans leeft en broedt in allerlei gebieden met open water in de buurt. Zijn nest bouwt de grauwe gans in het open gebied in het gras en in (rustige) bosjes.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de grauwe gans is dat van begin maart tot eind juli. Dan zijn nesten beschermd.
Grauwe gors	Vogel	De grauwe gors leeft op akkers, graslanden en gebieden die door de mens onderhouden worden zoals spoor- en wegbermen, slootkanten en plantsoenen. De grauwe gors broedt in de uiterwaarden.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de grauwe gors is dat van half april tot eind augustus. Dan zijn nesten beschermd.
Grauwe kiekendief	Vogel	De grauwe kiekendief leeft in Nederland vooral op akkers met graan of luzerne en op braakliggend land. De grauwe kiekendief broedt in grote akkerbouwgebieden en (vroeger ook) in moerassen.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de grauwe kiekendief is dat van mei tot half september. Dan zijn nesten beschermd.
Grauwe klauwier	Vogel	De grauwe klauwier leeft vooral in gebieden met struiken en kruiden waarin veel (grote) insecten leven. De grauwe klauwier broedt in struiken op heidevelden en in extensief cultuurlandschap.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de grauwe klauwier is dat van mei tot eind augustus. Dan zijn nesten beschermd. In Limburg geldt een uitzondering. Daar zijn de nesten het jaarrond beschermd tenzij in de omgeving voldoende alternatief leefgebied aanwezig is. Om dat vast te stellen is vooraf extra onderzoek nodig.
Grauwe vliegenvanger	Vogel	De grauwe vliegenvanger leeft en broedt in loof- en gemengde bossen, erven, parken, tuinen en boomgaarden. Zijn nest bouwt de grauwe vliegenvanger onder andere in holttes of op platte stukken (plateaus) in een boom of gebouw.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de grauwe vliegenvanger is dat van half april tot eind augustus. Dan zijn nesten beschermd. De grauwe vliegenvanger broedt vaak op hetzelfde nest. In Overijssel, Noord-Brabant, Zuid-Holland, Noord-Holland, Zeeland, Gelderland en Utrecht geldt daarom een uitzondering. Hier mogen deze nesten nooit weggehaald worden, tenzij in de omgeving voldoende geschikte plekken zijn om een nieuw nest te bouwen. Om dat vast te stellen is vaak vooraf extra onderzoek nodig.
Groene glazenmaker	Andere diersoort dan vogels of zoogdieren	De groene glazenmaker is een libelle en leeft in sloten of moerassen met krabbenscheer.	Faseer het schoonmaken van sloten en laat krabbenscheervegetaties zo veel mogelijk staan in het gebied waar de groene glazenmaker leeft.

Groene nachtorchis	Plant	De groene nachtorchis groeit in graslanden met veel kalk in de grond.	Voer in het gebied waar de groene nachtorchis voorkomt zo min mogelijk werkzaamheden uit. Bijvoorbeeld door het onderhoud te beperken. Maai bij voorkeur als de zaden zijn afgezet. Voor de groene nachtorchis begint deze periode meestal in augustus.
Groene specht	Vogel	De groene specht leeft vooral in loof- en gemengde bossen met oude bomen en open plekken en in oude parken maar ook in boerenland met bosjes en boomgaarden komen ze voor. De groene specht broedt meestal in een zelfgehakt hol in een oude loofboom.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de groene specht is dat van begin april (soms half maart) tot eind juli. Dan zijn nesten beschermd. De groene specht broedt vaak op hetzelfde nest. In Flevoland, Overijssel, Noord-Brabant, Zuid-Holland, Noord-Holland, Zeeland, Gelderland en Utrecht geldt daarom een uitzondering. Hier mogen deze nesten nooit weggehaald worden, tenzij in de omgeving voldoende geschikte plekken zijn om een nieuw nest te bouwen. Om dat vast te stellen is vaak vooraf extra onderzoek nodig.
Groenknolorchis	Plant	De groenknolorchis groeit vooral op vochtige plekken in de duinen (duinvalleien), op water drijvende veengrond (trilveen) en in veenmosrietlanden. De groenknolorchis komt soms ook voor op bedrijventerreinen waar zand is opgespoten.	Voer in het gebied waar de groenknolorchis voorkomt zo min mogelijk werkzaamheden uit. Bijvoorbeeld door het onderhoud te beperken. Maai bij voorkeur als de zaden zijn afgezet. Voor de groenknolorchis begint deze periode meestal begin september.
Groenling	Vogel	De groenling leeft en broedt meestal in bosjes, parken, grote tuinen, kwekerijen, etc.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de groenling is dat van begin april (soms vanaf half maart) tot eind augustus. Dan zijn nesten beschermd.
Groensteel	Plant	Groensteel groeit vooral op oude vochtige muren waar veel kalk in zit.	Voorkom beschadiging van groensteel bij het herstellen van muren en gebruik zacht, kalkrijk materiaal om muren te voegen. Hiermee wordt (her-)vestiging van groensteel bevorderd.
Groot spiegelklokje	Plant	Het groot spiegelklokje groeit op akkers, dijken en braakliggende grond, in berm en langs spoorwegen.	Voer zo min mogelijk werkzaamheden uit, bijvoorbeeld door niet te maaien, als het groot spiegelklokje bloeit. Deze periode loopt van mei tot en met augustus. Voer werkzaamheden in de bodem bij voorkeur uit als de zaden rijp zijn. Voor het groot spiegelklokje begint deze periode meestal ook in augustus. Hierdoor kunnen nieuwe planten makkelijker kiemen.

Grote bonte specht	Vogel	De grote bonte specht leeft in bossen, parken en tuinen. De grote bonte specht broedt meestal in een zelfgehakt hol in een boom.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de grote bonte specht is dat van half maart tot eind juli. Dan zijn nesten beschermd. De grote bonte specht specht broedt vaak op hetzelfde nest. In Flevoland, Overijssel, Noord-Brabant, Zuid-Holland, Noord-Holland, Zeeland, Gelderland en Utrecht geldt daarom een uitzondering. Hier mogen deze nesten nooit weggehaald worden, tenzij in de omgeving voldoende geschikte plekken zijn om een nieuw nest te bouwen. Om dat vast te stellen is vaak vooraf extra onderzoek nodig.
Grote bosaardbei	Plant	De grote bosaardbei groeit in berm, loofbossen met veel licht, struikgewas, bosranden, houtwallen en langs uitgesleten (holle) wegen.	Voer in het gebied waar de grote bosaardbei voorkomt zo min mogelijk werkzaamheden uit. Bijvoorbeeld door het onderhoud te beperken.
Grote bosmuis	Zoogdier	De grote bosmuis heeft allerlei soorten leefgebieden zolang ze zich maar kunnen verstoppen. Voorbeelden hiervan zijn parken, braakliggend terrein, duinen, tuinen en bosranden. De grote bosmuis is vooral s' nachts actief.	Houdt bij werkzaamheden rekening met het leefgebied van de grote bosmuis, bijvoorbeeld door struiken aan te planten en verspreid liggende stenen te laten liggen zodat de grote bosmuis zich kan verstoppen.
Grote gele kwikstaart	Vogel	De grote gele kwikstaart leeft en broedt langs de oevers van beken en rivieren, vaak in de buurt van bos maar ook regelmatig in dorpen waar een beek doorheen loopt. Het nest wordt vaak onder een brug of in een (half)holte in een oever gebouwd.	Vermijd werkzaamheden in het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de grote gele kwikstaart is dat van half maart (soms begin maart) tot eind augustus. De grote gele kwikstaart komt steeds terug naar hetzelfde nest en geschikte plekken zijn schaars. Deze nesten zijn daarom jaarrond beschermd. Haal nesten van de grote gele kwikstaart nooit weg.
Grote karekiet	Vogel	De grote karekiet leeft en broedt in rietvelden met riet dat ouder is dan een jaar (overjarig riet) en dat in het water staat.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de grote karekiet is dat van mei tot en half augustus. Dan zijn nesten beschermd.
Grote leeuwenklauw	Plant	De grote leeuwenklauw groeit in tuinen, op campingplaatsen, akkers, braakliggende grond en dijken, bij veevoederkuilen, in berm langs wegen en spoorlijnen en langs de waterkant.	Voer zo min mogelijk werkzaamheden uit, bijvoorbeeld door niet te maaien, als de grote leeuwenklauw bloeit. Deze periode loopt van mei tot en met juli. Voer werkzaamheden in de bodem bij voorkeur uit als de zaden rijp zijn. Voor de grote leeuwenklauw begint deze periode meestal in augustus. Hierdoor kunnen nieuwe planten makkelijker kiemen.

Grote lijster	Vogel	De grote lijster leeft en broedt in gebieden met hoge bomen en weilanden, vaak in de buurt van boomgaarden, parken en bosranden.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de grote lijster is dat van begin maart tot eind augustus. Dan zijn nesten beschermd.
Grote mantelmeeuw	Vogel	De grote mantelmeeuw leeft op grote, zoete en zoute, open wateren. De grote mantelmeeuw broedt vaak op rustige pieren en vooroevers met stortstenen, maar soms ook op ander open terrein, vaak bij meeuwenkolonies maar soms alleen.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de grote mantelmeeuw is dat van april tot eind augustus. Dan zijn nesten beschermd. De grote mantelmeeuw broedt vaak op hetzelfde nest of in de directe omgeving. In Friesland geldt een uitzondering. Hier mogen deze nesten nooit weggehaald worden, tenzij in de omgeving voldoende geschikte plekken zijn om een nieuw nest te bouwen. Om dat vast te stellen is vaak vooraf extra onderzoek nodig.
Grote modderkruiper	Andere diersoort dan vogels of zoogdieren	De grote modderkruiper is een vis en leeft in ondiepe wateren met een dikke modderlaag en veel waterplanten. Ze komen vooral in moerassen en poldersloten voor. Overdag zie je ze zelden, dan schuilen ze tussen de waterplanten of in de modder.	Vermijd werkzaamheden in de kwetsbare periodes. Voor de grote modderkruiper zijn dit de voortplantingsperiode, de winterrustperiode en de periodes waarin sloten en andere watergangen door droogte zonder water komen te staan. De minst kwetsbare periode is van september t/m oktober, dit is na de voortplanting en vóór de overwintering. Vermijd werkzaamheden wanneer het leefgebied zeer droog is. Laat verwijderde modder en waterplanten 24 uur liggen zodat de grote modderkruipers eruit kunnen kruipen. Raadpleeg voor meer informatie het kennisdocument over deze soort op de website van BIJ12.
Grote parelmoervlinder	Andere diersoort dan vogels of zoogdieren	De grote parelmoervlinder is een vlinder en leeft in de duinen en op de Veluwe op plekken met grasland met viooltjes en ruigere delen met nectarplanten.	Voorkom het dichtgroeien van grasland en zorg dat er voldoende bloemen in de omgeving staan zodat de grote parelmoervlinder nectar kan vinden.
Grote vuurvlinder	Andere diersoort dan vogels of zoogdieren	De grote vuurvlinder is een vlinder dat voorkomt in laagveen moerassen en leeft van waterzuring.	Houd bij werkzaamheden rekening met het behoud van het leefgebied van de grote vuurvlinder.
Grote weerschijnvlinder	Andere diersoort dan vogels of zoogdieren	De grote weerschijnvlinder is een vlinder en leeft in vochtige bossen met boswilg en open plekken.	Houd bij werkzaamheden rekening met het behoud van het leefgebied van de grote weerschijnvlinder.

Grote zilverreiger	Vogel	De grote zilverreiger leeft op weilanden en in sloten. De grote zilverreiger broedt onder andere in moerassen met riet.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de grote zilverreiger is dat van april tot half september. Dan zijn nesten beschermd. In Friesland geldt een uitzondering; daar zijn de nesten van de grote zilverreiger jaarrond beschermd. Haal nesten van de grote zilverreiger in Friesland nooit weg.
Grutto	Vogel	De grutto leeft en broedt op vochtig grasland met veel kruiden en insecten.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de grutto is dat van begin maart tot half juli (soms eind juli). Dan zijn nesten beschermd. De grutto broedt vaak op hetzelfde nest of in de directe omgeving. In Limburg, Overijssel, Gelderland en Friesland geldt daarom een uitzondering. Hier mogen deze nesten nooit weggehaald worden, tenzij in de omgeving voldoende geschikte plekken zijn om een nieuw nest te bouwen. Om dat vast te stellen is vaak vooraf extra onderzoek nodig.
Haas	Zoogdier	De haas leeft vooral in gebieden waar de gras- en landbouw een beperkte omvang heeft en in open veld zoals akkers en weilanden. Daarnaast komt de haas ook voor in open bos, heide en kwelders.	In alle provincies geldt voor de haas het hele jaar een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling, behalve in Zeeland. Utrecht en Groningen. Niettemin geldt de zorgplicht. Houd daarom bij werkzaamheden rekening met het behoud van het leefgebied van de haas, bijvoorbeeld door het aanleggen van hagen en houtwallen en door te zorgen voor kruidenrijk grasland waardoor de haas afwisselend kan eten.
Hamster	Zoogdier	De hamster leeft vooral op graanakkers en grond waarop luzerne wordt verbouwd, maar soms ook in bietenvelden, boomgaarden, tuinen en bermen. Hamsters houden van september-november tot half februari-mei een winterslaap.	Voor de hamster bestaat een uitgebreid beschermingsprogramma om het leefgebied te herstellen. Houd bij werkzaamheden rekening met het behoud van het leefgebied van de hamster, bijvoorbeeld door graan laat of niet te oogsten en luzerne te verbouwen in het gebied waar de hamster leeft.

Havik	Vogel	De havik leeft en broedt in het bos. Voor zijn voedsel jaagt de havik in het bos en in open gebied.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de havik is dat van begin maart tot eind augustus. De havik komt ieder jaar terug naar hetzelfde nest. Daarom zijn de nesten jaarrond beschermd. Haal nesten van de havik nooit weg. In Flevoland zijn nesten jaarrond beschermd, tenzij in de omgeving voldoende geschikte plekken zijn om een nieuw nest te bouwen. Om dat vast te stellen is vaak vooraf extra onderzoek nodig. Kijk voor de regels over jaarrond beschermde nesten in de Omgevingsverordening van de provincie.
Hazelmuis	Zoogdier	De hazelmuis leeft vooral in en nabij loofbossen. Ze hebben daarbij een voorkeur voor een dichte begroeiing van bramen, hazelaars, adelaarsvaren en kamperfoelie. Hazelmuisen komen soms ook voor in grote tuinen.	Vermijd werkzaamheden in de kwetsbare periode. Voor de hazelmuis is dit de periode waarin de jongen in het nest verblijven. Maai en snoei niet tussen september en november waardoor nesten kunnen worden vernietigd. Houd bij werkzaamheden rekening met het leefgebied van de hazelmuis, bijvoorbeeld door houtwallen met hazelaars aan te leggen om het leefgebied te vergroten.
Hazelworm	Andere diersoort dan vogels of zoogdieren	De hazelworm is een reptiel en leeft in heide, loofbos, schraal grasland, schrale bermen en soms ook in tuinen. Hazelwormen laten zich zelden zien en leven voor een groot deel ondergronds of schuilen onder planten.	Houd bij de werkzaamheden rekening met het behoud van het leefgebied van de hazelworm. Bijvoorbeeld door voor extra schuilplaatsen te zorgen. In Limburg geldt van juli tot en met september een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling of bestendig beheer en onderhoud. Deze vrijstelling geldt niet voor het doden van hazelwormen. Kijk voor meer informatie in de Omgevingsverordening van de provincie.
Heggenmus	Vogel	De heggenmus leeft en broedt in gebieden met struiken en heggen zoals jonge bossen, houtwallen, tuinen en parken.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de heggenmus is dat van half maart tot eind juli (soms half augustus). Dan zijn nesten beschermd.
Heidehommel	Andere diersoort dan vogels of zoogdieren	De heidehommel is een insect en leeft in natte heide, hoogveen en open bloemrijk grasland, vooral kalkgrasland.	Maai, plag of brand gefaseerd en zo laat mogelijk in het gebied waar de heidehommel leeft. Laat voor voldoende nestel- en overwinteringsplekken delen van de vegetatie ongemoeid van de zomer tot het einde van de zomer in het volgende jaar.

Heikikker	Andere diersoort dan vogels of zoogdieren	De heikikker is een amfibie en leeft vooral in vochtige gebieden die weinig of matig worden onderhouden. De heikikker komt voor in heide, hoogveen, laagveen, veenweidegebieden, half natuurlijk grasland en natte bossen.	Vermijd werkzaamheden in de voortplantingsperiode en tijdens de winterrust. Voor de heikikker betekent dit werkzaamheden het beste kunnen worden uitgevoerd in de periode tussen 1 augustus en 1 oktober. Voer werkzaamheden stap voor stap uit en werk één kant uit zodat de dieren tussendoor rust krijgen en kunnen vluchten. De heikikker houdt niet van een gecultiveerde omgeving. Zorg daarom voor extensief beheer van water, oevers en het aangrenzende land. Raadpleeg voor meer informatie het kennisdocument over deze soort op de website van BIJ12.
Hermelijn	Zoogdier	De hermelijn leeft in allerlei typen gebieden, van houtwallen, duinen, akkers tot vochtig terrein. Voorwaarde is wel dat de hermelijn er zich kan verstoppen. Daarvoor moet de begroeiing minimaal 15 centimeter hoog zijn.	Vermijd werkzaamheden in de kwetsbare periode. Voor de hermelijn is dit de voortplantingsperiode die loopt van 1 maart tot 1 augustus. Zorg voor voldoende eten en plekken waar de hermelijn zich kan verstoppen, bijvoorbeeld door geen muizen te bestrijden en niet korter dan 15 centimeter te maaien. Voer werkzaamheden stapsgewijs uit zodat altijd in een deel van het leefgebied rust is. In Limburg en Zuid-Holland geldt voor de hermelijn een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling. Raadpleeg voor meer informatie het kennisdocument over deze soort op de website van BIJ12.
Holenduif	Vogel	De holenduif leeft in gebieden met boerderijen, akkers en weilanden, maar ook in parken en oud bos. De holenduif broedt onder andere in hopen van bomen, in schuren en in uilenkasten.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de holenduif is dat van maart (soms eind februari) tot eind september (soms half oktober). Dan zijn nesten beschermd.
Honingorchis	Plant	De honingorchis groeit op vochtige plekken in de duinen (duinvalleien).	Voer in het gebied waar de honingorchis voorkomt zo min mogelijk werkzaamheden uit. Bijvoorbeeld door het onderhoud te beperken. Maai bij voorkeur als de zaden zijn afgezet. Voor de honingorchis begint deze periode meestal eind september.
Hoogveenglanslibel	Andere diersoort dan vogels of zoogdieren	De hoogveenglanslibel is een libelle en leeft in veenputjes in hoogvenen.	Voorkomen verdroging en verbossing van hoogvenen in het gebied waar de hoogveenglanslibel leeft.

Houtduif	Vogel	De houtduif leeft o.a in (loof)bos en op cultuurgrond. Houtduiven broeden in allerlei gebieden met bomen en struiken, van tuinen en parken tot bossen.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de meeste houtduiven is dat van begin mei tot eind oktober, maar tegenwoordig kunnen ze het hele jaar door broeden. Dan zijn nesten beschermd.
Houtsnip	Vogel	De houtsnip leeft en broedt in bossen met een vochtige bodem en veel begroeing.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de houtsnip is dat van begin maart tot eind september. Dan zijn nesten beschermd.
Huismus	Vogel	De huismus komt meestal voor in de buurt van mensen en leeft dan vooral in struiken, het liefst met stekels die het hele jaar groen blijven, loofbomen en klimplanten. De huismus broedt in gebouwen, bijvoorbeeld onder dakpannen, en soms in klimop.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de huismus is dat van maart tot half augustus (soms tot eind september). De huismus is zeer honkvast en is het hele jaar rondom het nest aanwezig. Daarom zijn de nesten jaarrond beschermd. Haal nesten nooit weg. Houd daarnaast bij werkzaamheden rekening met het behoud van het leefgebied van de huismus. Bijvoorbeeld door struiken of klimplanten rondom de nesten te laten staan. Raadpleeg voor meer informatie het kennisdocument over deze soort op de website van BIJ12.
Huisspitsmuis	Zoogdier	De huisspitsmuis leeft in allerlei soorten gebieden. Voorwaarde is dat de bodem bedekt is met planten.	In alle provincies geldt voor de huisspitsmuis het hele jaar een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling. Niettemin geldt de zorgplicht. Houd bij werkzaamheden rekening met het behoud van het leefgebied van de huisspitsmuis, bijvoorbeeld door te zorgen voor ruig terrein met veel kruiden.
Huiszwaluw	Vogel	De huiszwaluw leeft in de buurt van gebouwen en bruggen en vangt zijn voedsel in de lucht. Het voedsel bestaat uit enorme hoeveelheden kleine vliegende insecten. De huiszwaluw bouwt zijn nesten onder andere tegen gevels en onder witte dakranden.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de huiszwaluw is dat van half april tot half september. De huiszwaluw komt ieder jaar terug naar hetzelfde nest. In Limburg, Overijssel, Drenthe en Friesland zijn nesten daarom jaarrond beschermd. In de andere provincies ook, tenzij in de omgeving voldoende geschikte plekken zijn om een nieuw nest te bouwen. Om dat vast te stellen is vaak vooraf extra onderzoek nodig. Kijk voor de regels over jaarrond beschermde nesten in de Omgevingsverordening van de provincie.

Hydroptila sparsa	Andere diersoort dan vogels of zoogdieren	Hydroptila sparsa is een insect met een breed leefgebied. Van grote rivieren tot laaglandbeken maar soms ook in zwak stromende grotere wateren of kanalen.	Zorg voor donkere plekken, hydroptila sparsa is erg gevoelig voor licht.
Iepenpage	Andere diersoort dan vogels of zoogdieren	De iepenpage is een vlinder en leeft in de kroon van iepen en heeft graag lindes in de omgeving om nectar te kunnen drinken. Ze komen ook vaak in de bebouwde kom voor.	Plant iepen en wilgen om een geschikt leefgebied voor de iepenpage te creëren.
Ijsvogel	Vogel	De ijsvogel leeft en broedt in de steile oevers langs schoon water, bijvoorbeeld bij beekjes, maar ook bij plassen.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de ijsvogel is dat van april (soms al vanaf tweede helft februari) tot eind oktober. De ijsvogel broedt vaak op hetzelfde nest. In Friesland zijn nesten daarom jaarrond beschermd. In de andere provincies ook, maar mogelijk zijn er uitzonderingen. Kijk voor de regels over jaarrond beschermde nesten in de Omgevingsverordening van de provincie
Kalkboterbloem	Plant	De kalkboterbloem groeit in graslanden en bosranden op grond waar veel kalk in zit.	Voer in het gebied waar de kalkboterbloem voorkomt zo min mogelijk werkzaamheden uit. Bijvoorbeeld door het onderhoud te beperken. Maai bij voorkeur als de zaden zijn afgezet. Voor de kalkboterbloem begint deze periode meestal begin september.
Kalketrip	Plant	De kalketrip groeit vooral langs paden op droge grond die veel voedsel en kalk bevat.	Voer in het gebied waar de kalketrip groeit zo min mogelijk werkzaamheden uit. Bijvoorbeeld door het onderhoud te beperken. Voer werkzaamheden in de bodem bij voorkeur uit als de zaden rijp zijn. Voor de kalketrip begint deze periode meestal half september. Hierdoor kunnen nieuwe planten makkelijker kiemen.
Kamsalamander	Andere diersoort dan vogels of zoogdieren	De kamsalamander is een amfibie en leeft in en rond poelen met een goede waterkwaliteit. Vaak zijn er veel oever- en waterplanten aanwezig. Overdag zie je de kamsalamander zelden, dan schuilen ze tussen de planten op de oever of in het water.	Vermijd werkzaamheden in het water in de voortplantingsperiode en werkzaamheden op het land buiten deze periode. Voor de kamsalamander betekent dit dat werkzaamheden in het water waarschijnlijk het beste kunnen worden uitgevoerd in de periode tussen oktober en januari en werkzaamheden op het land het beste tussen april en juli. Raadpleeg voor meer informatie het kennisdocument over deze soort op de website van BIJ12.

Karwijselie	Plant	De karwijselie groeit in graslanden, bosranden en bossen met veel licht.	Voer zo min mogelijk werkzaamheden uit in het gebied waar de karwijselie voorkomt. Bijvoorbeeld door het onderhoud te beperken. Maai bij voorkeur als de karwijselie heeft gebloeid en zijn zaden heeft afgezet. Deze periode begint meestal begin september.
Kauw	Vogel	De kauw leeft vooral in een bebouwde omgeving. Ook in de kauw te vinden op akkers en kleinschalige weides en in kleinere bossen. Kauwen broeden vooral in gebouwen (schoorstenen), maar ook in holle bomen en zelfs in konijnenholen.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de kauw is dat van half maart tot begin juli. Dan zijn nesten beschermd.
Kempense heidelibel	Andere diersoort dan vogels of zoogdieren	De Kempense heidelibel is een libelle en leeft in ondiep water dat in de winter droogvalt. Vaak zijn het visvijvers of rietlanden voor rietproductie.	Houd bij de werkzaamheden rekening met het behoud van het leefgebied van de Kempense heidelibel.
Kemphaan	Vogel	De kemphaan leeft en broedt in natte graslanden die worden gehooïd of weinig begraasd met slootjes, poelen en slikranden.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de kemphaan is dat van april tot half augustus. Dan zijn nesten beschermd.
Kerkuil	Vogel	De kerkuil leeft vooral op het boerenland. Om te rusten en te broeden gebruikt de kerkuil graag gebouwen zoals schuren en kerktorens en vaak ook nestkasten. Kerkuilen eten vooral muizen en blijven meestal hun hele leven in hetzelfde gebied.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de kerkuil is dat van half januari tot eind augustus. Als er veel eten is (muizen), dan kan het broedseizoen bijna het hele jaar doorlopen. De kerkuil broedt meestal op hetzelfde nest. Geschikte plekken voor nesten zijn schaars. De nesten worden het hele jaar door ook gebruikt om te rusten. Daarom zijn nesten jaarrond beschermd. Haal nesten van de kerkuil nooit weg. Raadpleeg voor meer informatie het kennisdocument over deze soort op de website van BIJ12.
Kievit	Vogel	De kievit leeft en broedt vooral op agrarische grond, zowel op grasland als akkers, en in drassige heidevelden, moerassen en duinen.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de kievit is dat van maart (soms al eind februari) tot eind juli. Dan zijn nesten beschermd.
Klaverblauwtje	Andere diersoort dan vogels of zoogdieren	Het klaverblauwtje is een vlinder en leeft op rode klaver in niet al te schrale graslanden.	Maai gefaseerd en behoud rode klaver zodat de rupsen van het klaverblauwtje kunnen overleven.

Klein waterhoen	Vogel	Het klein waterhoen leeft en broedt vooral in gebieden met moerassen, vennen en rietlanden.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor het klein waterhoen is dat van mei tot eind oktober. Dan zijn nesten beschermd.
Kleine barmsijs	Vogel	De kleine barmsijs leeft in berken en elzen. Soms zoeken ze op de grond naar voedsel. De kleine barmsijs broedt in jonge naaldbossen en berkenbossen.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de kleine barmsijs is dat van april tot half augustus. Dan zijn nesten beschermd.
Kleine bonte specht	Vogel	De kleine bonte specht leeft vooral in bossen, parken en tuinen en op landgoederen. De kleine bonte specht broedt meestal in een zelfgehakt hol in een loofboom, bij voorkeur een berk, populier, wilg of els.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de kleine bonte specht is dat van april tot eind juli. Dan zijn nesten beschermd. De kleine bonte specht broedt vaak op hetzelfde nest. In Flevoland, Overijssel, Drenthe, Friesland, Noord-Brabant, Zuid-Holland, Noord-Holland, Zeeland, Gelderland en Utrecht geldt daarom een uitzondering. Hier mogen deze nesten nooit weggehaald worden, tenzij in de omgeving voldoende geschikte plekken zijn om een nieuw nest te bouwen. Om dat vast te stellen is vaak vooraf onderzoek nodig.
Kleine ereprijs	Plant	De kleine ereprijs groeit in zeeduin, rivierduin en op dijken.	Voer zo min mogelijk werkzaamheden uit in het gebied waar de kleine ereprijs voorkomt. Bijvoorbeeld door het onderhoud te beperken. Houd andere planten en struiken klein, bijvoorbeeld door begrazing.
Kleine heivlinder	Andere diersoort dan vogels of zoogdieren	De kleine heivlinder is een vlinder en leeft op stuifzand.	Houd bij werkzaamheden rekening met het behoud van het leefgebied van de kleine heivlinder.
Kleine ijsvogelvlinder	Andere diersoort dan vogels of zoogdieren	De kleine ijsvogelvlinder is een vlinder en leeft in vochtige loofbossen met kamperfoelie, vooral op de open plekken en in de bosranden.	Behoud bosranden met kamperfoelie zodat de kleine ijsvogelvlinder een geschikt leefgebied heeft.
Kleine karekiet	Vogel	De kleine karekiet leeft en broedt in moerassen, sloten en vaarten met riet.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de kleine karekiet is dat van begin mei tot eind augustus. Dan zijn nesten beschermd.

Kleine mantelmeeuw	Vogel	De kleine mantelmeeuw leeft in duinen, strandvlaktes, kwelders, schorren en dijken, maar steeds vaker ook op graslanden met veel water. De kleine mantelmeeuw broedt in kolonies in duinen, kwelders en op platte daken.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de kleine mantelmeeuw is dat van half april tot half augustus. Dan zijn nesten beschermd. In Friesland geldt buiten het broedseizoen een uitzondering; daar mogen nesten van de kleine mantelmeeuw buiten het broedseizoen alleen worden weggehaald als er alternatieven zijn. Om dat vast te stellen is vaak vooraf extra onderzoek nodig.
Kleine modderkruiper	Andere diersoort dan vogels of zoogdieren	De kleine modderkruiper is een vis en leeft in ondiepe wateren met veel waterplanten. De soort komt in vrijwel heel Nederland voor in o.a. sloten, vaarten en riviertjes. Overdag zie je ze zelden, ze schuilen dan tussen de waterplanten.	Vermijd werkzaamheden in de kwetsbare periodes. Voor de kleine modderkruiper zijn dit de voortplantingsperiode, de winterrustperiode en de periodes waarin sloten en andere watergangen door droogte zonder water komen te staan. De minst kwetsbare periode is van september tot en met november, dit is na de voortplanting en vóór de overwintering. Maak sloten en ander water stap voor stap schoon. Laat verwijderde modder en waterplanten 24 uur op de oevers liggen zodat de kleine modderkruipers eruit kunnen kruipen.
Kleine plevier	Vogel	De kleine plevier leeft en broedt op grond die niet of weinig is begroeid, vaak in de buurt van water. De kleine plevier is een pionierssoort, dit betekent dat de soort zich er vaak als eerste vestigt, bijvoorbeeld als een gebied kaal en nat is.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de kleine plevier is dat van april tot half augustus. Dan zijn nesten beschermd.
Kleine schorseneer	Plant	De kleine schorseneer groeit op de heide en in graslanden die niet zijn bemest.	Voer zo min mogelijk werkzaamheden uit in het gebied waar de kleine schorseneer voorkomt. Bijvoorbeeld door onderhoud te beperken. Maai bij voorkeur als de zaden zijn afgezet. Voor de kleine schorseneer begint deze periode meestal begin augustus. Houd andere planten en struiken klein, bijvoorbeeld door begrazing of maaien, dan wordt de kleine schorseneer niet overgroeid.

Kleine watersalamander	Andere diersoort dan vogels of zoogdieren	De kleine watersalamander is een amfibie en leeft in poelen, vennen, sloten, en tuin- en stadsvijvers. De kleine watersalamander overwintert in vorstvrije en ruimten zoals muizenholen, tussen boomwortels en in spleten in muren of hout.	In alle provincies geldt het hele jaar een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling. Niettemin geldt de zorgplicht; zorg voor water en oevers met veel planten om te kunnen schuilen en stenen en houtstronken om onder te overwinteren. Kleine watersalamanders verblijven vanaf maart tot in de zomermaanden in het water. Laat daarom, ook in het kader van de zorgplicht, bij baggeren de verwijderde modder en planten 24 uur op de oevers liggen zodat de kleine salamanders eruit kunnen kruipen.
Kleine wolfsmelk	Plant	De kleine wolfsmelk groeit in perken en bermen, op akkers, dijken, braakliggende- en omgespitte grond en langs spoorwegen.	Voer zo min mogelijk werkzaamheden uit, bijvoorbeeld door niet te maaien, als de kleine wolfsmelk bloeit. Deze periode loopt van mei tot en met oktober. Voer werkzaamheden in de bodem bij voorkeur uit als de zaden rijp zijn. Voor de kleine wolfsmelk begint deze periode meestal ook in oktober. Hierdoor kunnen nieuwe planten makkelijker kiemen.
Kleine wrattenbijter	Andere diersoort dan vogels of zoogdieren	De kleine wrattenbijter is een sprinkhaan en leeft op grote militaire oefenterreinen waar de vegetatie wordt gebrand.	Beheer het terrein in het gebied waar de kleine wrattenbijter leeft.
Kleine zilverreiger	Vogel	De kleine zilverreiger leeft en broedt in gebieden met ondiep zoet of zout water, zoals moerassen en lagunes.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de kleine zilverreiger is dat van begin mei (soms eind april) tot eind juli (soms half augustus). Dan zijn nesten beschermd.
Kleinst waterhoen	Vogel	Het kleinst waterhoen leeft en broedt in moerassen met water dat niet dieper is dan 30 cm.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de kleinst waterhoen is dat van mei tot half september. In het broedseizoen zijn nesten beschermd.
Kluut	Vogel	De kluut leeft en broedt in allerlei gebieden met ondiep open water en een modderige bodem.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de kluut is dat van begin april tot eind augustus. Dan zijn nesten beschermd.
Kluwenklokje	Plant	Het kluwenklokje groeit vooral in bermen, bosranden en graslanden, tussen struiken en op rivierdijken en zandruggen in uiterwaarden.	Voer zo min mogelijk werkzaamheden uit, bijvoorbeeld door het onderhoud te beperken, als het kluwenklokje bloeit. Deze periode loopt van mei tot en met augustus.
Knautiabij	Andere diersoort dan vogels of zoogdieren	De knautiabij is een insect en leeft op bloemrijk grasland waar de voedselplant beemdkroon veel groeit.	Maai het grasland gefaseerd zodat beemdkroon gedurende de hele vliegtijd beschikbaar is .

Kneu	Vogel	De kneu leeft en broedt in gebieden waar bomen, heggen, bosjes en lage planten elkaar afwisselen. Vaak in de buurt van braakliggend terrein en in landbouwgebieden.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de kneu is dat van begin april tot half augustus (soms eind augustus). Dan zijn nesten beschermd.
Knobbelzwaan	Vogel	De knobbelzwaan leeft en broedt in allerlei gebieden met open zoet, niet te diep water, maar komt ook voor in parken. De knobbelzwaan is graag in de buurt van weilanden om te kunnen grazen.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de knobbelzwaan is dat van begin maart (soms al eind februari) tot eind oktober. Dan zijn nesten beschermd.
Knoflookpad	Andere diersoort dan vogels of zoogdieren	De knoflookpad is een amfibie en leeft in zandige omgevingen zoals open rivierduinen. De knoflookpad plant zich voort in het water van beek- en rivierdalen. Knoflookpadden zijn vooral 's nachts actief. Overdag graven ze zich in het zand in.	Vermijd werkzaamheden in de voortplantingsperiode. Voor de knoflookpad betekent dit dat werkzaamheden in het water het beste kunnen worden uitgevoerd in de periode van 1 augustus tot aan het begin van de winter. Houd bij werkzaamheden op het land rekening met het behoud van het leefgebied van de knoflookpad. Bijvoorbeeld door te zorgen voor schoon water waarin de knoflookpad zich kan voortplanten. In de buurt van het water moet open zand liggen. Dit heeft de knoflookpad nodig om zich in te kunnen graven.
Knollathyrus	Plant	De knollathyrus groeit op kaalgekapte bospercelen en op de heide, in bermen, graslanden, afgravingen, bossen en bosranden en tussen struiken.	Voer in het gebied waar de knollathyrus voorkomt zo min mogelijk werkzaamheden uit. Bijvoorbeeld door het onderhoud te beperken. Maai bij voorkeur als het zaad is afgezet. Voor de knollathyrus begint deze periode half oktober.
Knolspirea	Plant	De knolspirea groeit in bermen, graslanden en bosranden.	Voer in het gebied waar de knolspirea voorkomt zo min mogelijk werkzaamheden uit. Bijvoorbeeld door het onderhoud te beperken.
Koekoek	Vogel	De koekoek leeft in allerlei soorten gebieden. De aanwezigheid van insecten (rupsen), broedende zangvogeltjes, en uitkijkposten is belangrijk. De koekoek bouwt zelf geen nest maar legt zijn eieren in het nest van een zangvogeltje.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de koekoek is dat van half april tot half augustus. Dan zijn nesten beschermd.

Kokmeeuw	Vogel	De kokmeeuw leeft in allerlei gebieden met veel water langs de kust en in het binnenland. De kokmeeuw broedt in kolonies in onder andere kwelders, duinen, vennen en op opspuitterreinen en kort begroeide eilandjes met plassen.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de kokmeeuw is dat van begin april tot half augustus (soms eind augustus). Dan zijn nesten beschermd. In Drenthe en Friesland gelden buiten het broedseizoen uitzonderingen; daar mogen nesten van de kokmeeuw buiten het broedseizoen alleen worden weggehaald als er alternatieven zijn. Om dat vast te stellen is vaak vooraf extra onderzoek nodig.
Kolgans	Vogel	De kolgans leeft in open weidegebieden, voedselrijke graslanden, moerassen en akkers met klaver en granen. De kolgans broedt in rietzomen, op graslanden en langs polderdijken.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de kolgans is dat van begin april tot eind juli. Dan zijn nesten beschermd.
Kommavlinder	Andere diersoort dan vogels of zoogdieren	De kommavlinder is een vlinder en leeft op droge graslanden en heide en in duinen. Er moeten niet alleen open plekjes en polletjes gras maar ook nectarplanten voorkomen.	Houd bij werkzaamheden rekening met het behoud van het leefgebied van de kommavlinder.
Konijn	Zoogdier	Het konijn leeft in halfopen (droge) landschappen zoals tuinen, perken, parken, graslanden en bosranden. Konijnen leven in hopen en hebben daarom een voorkeur voor zandige bodems omdat ze daarin makkelijk kunnen graven.	In alle provincies geldt voor het konijn het hele jaar een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling, behalve in Zeeland en Utrecht. Niettemin geldt de zorgplicht. Houd daarom bij werkzaamheden rekening met het behoud van het leefgebied van het konijn, bijvoorbeeld door verspreid stukken gras redelijk kort te maaien en te zorgen voor open plekken met zand.
Koolmees	Vogel	De koolmees leeft in bossen, maar komt ook veel voor in begroeiing in dorpen, steden en het buitengebied. De koolmees broedt in gebieden met bomen en houtige struiken, vaak in nestkasten en in boomholtes.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de koolmees is dat van half maart tot in juli. Dan zijn nesten beschermd. De koolmees broedt vaak op hetzelfde nest of in de directe omgeving. In Noord-Brabant, Zuid-Holland, Noord-Holland, Zeeland, Gelderland en Utrecht geldt daarom een uitzondering. Hier mogen deze nesten nooit weggehaald worden, tenzij in de omgeving voldoende geschikte plekken zijn om een nieuw nest te bouwen. Om dat vast te stellen is vaak vooraf extra onderzoek nodig.
Koolzwarte zandbij	Andere diersoort dan vogels of zoogdieren	De koolzwarte zandbij is een insect en leeft in open bloemrijk landschap.	Maai gefaseerd en zo laat mogelijk in het gebied waar de koolzwarte zandbij leeft. Zorg daarnaast voor open zanderige plekken om te kunnen nestelen.

Korensla	Plant	Korensla groeit tussen het graan en in bermen op droge zandgrond die weinig kalk bevat.	Voer zo min mogelijk werkzaamheden uit, bijvoorbeeld door niet te maaien, als korensla bloeit. Deze periode loopt van mei tot en met september. Voer werkzaamheden in de bodem bij voorkeur uit als de zaden rijp zijn. Voor korensla begint deze periode meestal in oktober. Hierdoor kunnen nieuwe planten makkelijker kiemen.
Korhoen	Vogel	Het korhoen leeft en broedt op heidevelden met berken- en/of dennenbosjes, bij voorkeur in de buurt van extensief kleinschalig cultuurland.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor het korhoen is dat van half maart tot eind augustus. Dan zijn nesten beschermd.
Kraanvogel	Vogel	De kraanvogel leeft in open gebieden zoals moerassen, lagunes, droge graslanden en landbouwgebieden. De kraanvogel broedt onder andere in boomloze moerassen, natte heidevelden en natte gebieden met rietvelden.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de kraanvogel is dat van maart tot half augustus. Dan zijn nesten beschermd. In Drenthe en Friesland geldt buiten het broedseizoen een uitzondering; daar mogen nesten van de kraanvogel buiten het broedseizoen alleen worden weggehaald als er alternatieven zijn. Om dat vast te stellen is vaak vooraf extra onderzoek nodig.
Krakeend	Vogel	De krakeend leeft op beschutte plaatsen in natte gebieden, zoals moerassen, meren en sloten. De krakeend broedt bij voorkeur in de dekking bij ondiep, stilstaand of langzaam stromend open water.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de krakeend is dat vanaf begin maart tot half augustus. Dan zijn nesten beschermd.
Kramsvogel	Vogel	De kramsvogel leeft vooral in gebieden met grasland en groepen bomen. Vaak broeden ze in kolonies in houtwallen en boomgaarden in de buurt van grasland.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de kramsvogel is dat van half maart tot eind juli. Dan zijn nesten beschermd. In Limburg geldt een uitzondering. Daar zijn de nesten het jaarrond beschermd tenzij in de omgeving voldoende alternatief leefgebied aanwezig is. Om dat vast te stellen is vooraf extra onderzoek nodig.
Krekelzanger	Vogel	De krekelzanger leeft in de buurt van water in grote moerasgebieden met riet en bomen, struiken of jong bos en een natte bodem.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de krekelzanger is dat van mei tot eind juli. Dan zijn nesten beschermd.
Krooneend	Vogel	De krooneend leeft en broedt bij voorkeur op grote, vrij diepe meren waar riet omheen staat. De krooneend komt ook voor op kleinere plassen met veel begroeiing op de oever.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de krooneend is dat van april tot eind augustus. Dan zijn nesten beschermd.

Kruipend moerasscherm	Plant	Kruipend moerasscherm groeit langs waterkanten, in zeeduinen en in natte graslanden die in de winter onder water staan.	Voer zo mijn mogelijk werkzaamheden uit, bijvoorbeeld door onderhoud te beperken, als kruipend moerasscherm bloeit. Deze periode loopt van juni tot en met oktober. Zorg voor open plekken, bijvoorbeeld door begrazing of maaien, zodat nieuwe planten kunnen kiemen of uitbreiden.
Kruisbek	Vogel	De kruisbek leeft en broedt in naaldbossen.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de kruisbek van januari tot eind augustus. Dan zijn nesten beschermd.
Kuifeend	Vogel	De kuifeend leeft en broedt vooral in weidegebieden met sloten en vaarten en bij meren en plassen met zoet water.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de kuifeend is dat van april tot eind augustus. Dan zijn nesten beschermd.
Kuifmees	Vogel	De kuifmees leeft en broedt in naaldbossen, bij voorkeur in dennen.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de kuifmees is dat van half maart tot eind juli. Dan zijn nesten beschermd.
Kustbehangersbij	Andere diersoort dan vogels of zoogdieren	De kustbehangersbij is een insect en leeft vooral in duinstruweel, daarnaast in droge hei, kalkgrasland en ruderaal terrein.	Zorg voor voedselplanten zoals wikkes en rolklaver (vlinderbloemigen) en maai gefaseerd en zo laat mogelijk in het gebied waar de kustbehangersbij leeft.
Kwabaal	Andere diersoort dan vogels of zoogdieren	De kwabaal is een vis en leeft in rivieren en beken met helder stromend water maar ook in schone diepe meren. De kwabaal is vooral tijdens de nacht actief, overdag verschuilen ze zich onder stenen of in holtes.	Vermijd werkzaamheden in de voortplantings- en opgroeiperiode. Voor de kwabaal betekent dit dat werkzaamheden het beste kunnen worden uitgevoerd in de periode van september tot en met december. Laat rivieren en beken buiten hun oevers treden zodat overstromingsvlaktes ontstaan waar de larven en jonge kwabalen kunnen opgroeien. De kwabaal is een koudwatersoort. Voorkom opwarming van het water, bijvoorbeeld door het beperken van het lozen van koelwater.
Kwak	Vogel	De kwak leeft en broedt in bomen en struiken in gebieden met ondiep zoet water dat langzaam of niet stroomt en waarin veel vis zwemt.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de kwak is dat van half april tot eind augustus. Dan zijn nesten beschermd.

Kwartel	Vogel	De kwartel leeft en broedt in droog grasland en op akkers met graan of luzerne en onkruid.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de kwartel is dat van mei tot eind september. Dan zijn nesten beschermd. In Gelderland geldt een uitzondering, daar zijn nesten jaarrond beschermd tenzij in de omgeving voldoende geschikte plekken zijn om een nieuw nest te bouwen. Om dat vast te stellen is vaak vooraf extra onderzoek nodig. Kijk voor de regels over jaarrond beschermde nesten in de Omgevingsverordening van de provincie.
Kwartelkoning	Vogel	De kwartelkoning leeft en broedt in vochtige graslanden, vaak zijn dit uiterwaarden, en in de randen van akkers waar veel kruiden staan.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de kwartelkoning is dat van mei tot half oktober. Dan zijn nesten beschermd. In Limburg geldt een uitzondering. Daar zijn de nesten het jaarrond beschermd tenzij in de omgeving voldoende alternatief leefgebied aanwezig is. Om dat vast te stellen is vooraf extra onderzoek nodig.
Lepelaar	Vogel	De lepelaar leeft in ondiep, zoet, brak of zout water met een modderige of zandige bodem. De lepelaar broedt op de grond, vaak in het riet in grote moerassen en bij meren en rivieren, maar soms ook in bomen.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de lepelaar is dat van half maart tot eind augustus. Dan zijn nesten beschermd. In Friesland geldt een uitzondering, daar zijn de nesten van de lepelaar jaarrond beschermd. Haal nesten van de lepelaar in Friesland nooit weg.
Lepidostoma hirtum	Andere diersoort dan vogels of zoogdieren	Lepidostoma hirtum is een insect en leeft in de grotere beken en rivieren in de buurt van vochtige bossen.	Zorg voor een goede waterkwaliteit in het gebied waar lepidostoma hirtum leeft.

Levendbarende hagedis	Andere diersoort dan vogels of zoogdieren	De levendbarende hagedis is een reptiel en leeft in (natte) heide, hoogveen en bosranden maar soms ook in drogere heide, langs spoorlijnen en in bermen. Levendbarende hagedissen ontwaken in maart uit hun winterslaap.	Vermijd werkzaamheden in de voortplantingsperiode en tijdens de winterrust. Werk bij voorkeur tussen 15 augustus en 15 oktober. In Limburg geldt in deze periode een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling of bestendig beheer en onderhoud. Deze vrijstelling geldt niet voor het doden van levendbarende hagedissen. Kijk voor meer informatie in de Omgevingsverordening van de provincie. Houd ook rekening met het leefgebied. Bijvoorbeeld door planten en plaggen enkele dagen te laten liggen. Raadpleeg voor meer informatie het kennisdocument over deze soort op de website van BIJ12.
Liggende ereprijs	Plant	Liggende ereprijs groeit in rivier- en zeeduin en in graslanden.	Voer zo min mogelijk werkzaamheden uit, bijvoorbeeld door onderhoud te beperken, als liggende ereprijs bloeit. Deze periode loopt van april tot en met juni.
Limnephilus elegans	Andere diersoort dan vogels of zoogdieren	Limnephilus elegans is een insect en leeft in zure (hoog)veenwateren die stilstaan of zwak stromen.	Zorg voor vochtige plekken en een donkere omgeving, limnephilus elegans is erg gevoelig voor verdroging en licht.
Limnephilus stigma	Andere diersoort dan vogels of zoogdieren	Limnephilus stigma is een insect en leeft tussen de dichte vegetatie in (laag)veenmoerasgebieden en vennen. Vaak vallen deze periodiek droog in de zomer.	Voorkom intensief slootkantbeheer en kunstmatig peilbeheer. Zorg voor een donkere omgeving, Limnephilus stigma is erg gevoelig voor licht.
Matkop	Vogel	De matkop leeft vooral in gebieden met veel berken, wilgen of rotte boomstronken. De matkop broedt zowel in natuurgebieden en bossen als in boerenland met singels en houtwallen.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de matkop is dat van half maart tot eind juli. Dan zijn nesten beschermd.
Meerkikker	Andere diersoort dan vogels of zoogdieren	De meerkikker is een amfibie en leeft in water met veel voedsel en oevers met veel planten. Bijvoorbeeld poldersloten en meren. Vanaf begin oktober tot april houden meerkikkers een winterslaap. Meestal in de modder op de bodem van het water.	In alle provincies geldt het hele jaar een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling. Niettemin geldt de zorgplicht; vermijd zo veel mogelijk baggeren tijdens de winterperiode om te voorkomen dat meerkikkers tijdens de winterslaap worden gestoord en zorg voor water met oevers met veel planten zodat de meerkikkers kunnen schuilen. Laat, ook in het kader van de zorgplicht, bij baggeren verwijderde modder en planten 24 uur op de oevers liggen zodat de meerkikkers eruit kunnen kruipen.
Meerkoet	Vogel	De meerkoet leeft in allerlei gebieden met open water. De meerkoet broedt meestal op de oevers maar soms op het water op een nest dat is gebouwd op waterplanten.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de meerkoet is dat van half maart (soms begin maart) tot eind augustus (soms tot half september). In het broedseizoen zijn nesten beschermd.

Merel	Vogel	De merel leeft en broedt in allerlei gebieden zoals loofbos en parken en tuinen in dorpen en steden. Belangrijk is dat er bomen met bladeren en/of dichte struiken staan.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de merel is dat van begin maart tot eind juli (soms half augustus). Dan zijn nesten beschermd.
Middelste bonte specht	Vogel	De middelste bonte specht leeft in bossen en parken. De middelste bonte specht broedt in loof- en gemengd bos met oude bomen en dood hout.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de middelste bonte specht is dat van april tot eind juli. Dan zijn nesten beschermd. De middelste bonte specht broedt vaak op hetzelfde nest of in de directe omgeving. In Flevoland, Overijssel, Gelderland, Drenthe en Friesland geldt daarom een uitzondering. Hier mogen deze nesten nooit weggehaald worden, tenzij in de omgeving voldoende geschikte plekken zijn om een nieuw nest te bouwen. Om dat vast te stellen is vaak vooraf extra onderzoek nodig.
Middelste zaagbek	Vogel	De middelste zaagbek leeft en broedt vooral in gebieden met zout en/of brak water. Het nest wordt meestal gemaakt op een rustig eilandje of op een oever onder struiken of tussen grassen en kruiden.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de middelste zaagbek is dat van half april tot en met september. Dan zijn nesten beschermd.
Moshommel	Andere diersoort dan vogels of zoogdieren	De moshommel is een insect en leeft in open en vaak vochtige bloemrijk landschap in het laagveen- en zeekleigebied. Daarnaast in veenweidegebied, slikken en schorren en op zeedijken.	Maai zo laat mogelijk en gefaseerd in het gebied waar de moshommel leeft. Laat voor voldoende nestel- en overwinteringsplekken delen van de vegetatie ongemaaid van de zomer tot het einde van de zomer in het volgende jaar.
Muurbloem	Plant	De muurbloem groeit op rotsachtige plaatsen zoals kademuren, oude stadsmuren, afgravingen en ruïnes.	Voorkom beschadiging van de muurbloem bij het herstellen van muren en gebruik zacht, kalkrijk materiaal om muren te voegen. Hiermee wordt (her-)vestiging van de muurbloem bevorderd.
Muurhagedis	Andere diersoort dan vogels of zoogdieren	De muurhagedis is een reptiel en leeft vooral op oude muren met muurplanten, verwaarloosde terreinen met stenen, langs verlaten spoorlijnen en op mergelwanden in (voormalige) groeves. Ze houden een winterslaap van november tot half februari.	Vermijd werkzaamheden in de voortplantingsperiode en in de winterrust. Voor de muurhagedis betekent dit dat werkzaamheden het beste kunnen worden uitgevoerd in de zomer en herfst. Houd bij werkzaamheden rekening met het behoud van het leefgebied van de muurhagedis. Bijvoorbeeld door te zorgen voor muren met openingen waarin de muurhagedis kan schuilen. Neem voor maatwerk contact op met een specialist voor deze soort.

Naakte lathyrus	Plant	De naakte lathyrus groeit op akkers, omgewerkte grond en dijken, in bermen en bosranden, tussen struiken en langs uitgesleten (holle) wegen en spoorwegen.	Voer zo min mogelijk werkzaamheden uit, bijvoorbeeld door onderhoud te beperken, als de naakte lathyrus bloeit. Deze periode loopt van mei tot en met augustus. Voer werkzaamheden in de bodem bij voorkeur uit als de zaden rijp zijn. Voor de naakte lathyrus begint deze periode meestal in september. Hierdoor kunnen nieuwe planten makkelijker kiemen.
Naaldenkervel	Plant	De naaldenkervel groeit op akkers en ongewerkte grond, in bermen en bij haventerreinen.	Voer zo min mogelijk werkzaamheden uit, bijvoorbeeld door onderhoud te beperken, als naaldenkervel bloeit. Deze periode loopt van april tot en met juli. Voer werkzaamheden in de bodem bij voorkeur uit als de zaden rijp zijn. Voor naaldkervel begint deze periode meestal in augustus. Hierdoor kunnen nieuwe planten makkelijker kiemen.
Nachtegaal	Vogel	De nachtegaal leeft en broedt vooral in dichte struiken in duinen, in vochtige loofbossen en in houtwallen.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de nachtegaal is dat van half april tot eind juli. Dan zijn nesten beschermd.
Nachtzwaluw	Vogel	De nachtzwaluw leeft in (half) open natuurgebieden op zandgrond. Voorwaarde is dat er op de bodem weinig begroeiing staat. De nachtzwaluw broedt op heidevelden, op zandverstuivingen en in open dennenbossen.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de nachtzwaluw is dat van mei tot eind september. Dan zijn nesten beschermd. In Gelderland geldt een uitzondering, daar zijn nesten jaarrond beschermd tenzij in de omgeving voldoende geschikte plekken zijn om een nieuw nest te bouwen. Om dat vast te stellen is vaak vooraf extra onderzoek nodig. Kijk voor de regels over jaarrond beschermde nesten in de Omgevingsverordening van de provincie.
Noordse winterjuffer	Andere diersoort dan vogels of zoogdieren	De noordse winterjuffer is een insect en leeft in laagveen moeras met riet en verlandingsvegetaties. De noordse winterjuffer overwintert in heide of pijpenstrootje.	Houd bij de werkzaamheden rekening met het behoud van het leefgebied van de noordse winterjuffer.

Noordse woelmuis	Zoogdier	De noordse woelmuis komt vooral voor in vochtige en natte gebieden. Daar leeft de soort bijvoorbeeld in het riet. In het gebied moet het hele jaar voldoende voedsel zijn en moet de noordse woelmuis zich kunnen verstoppen.	Vermijd werkzaamheden in de kwetsbare periodes. Voor de noordse woelmuis zijn dit de voortplantings- en de winterrustperiode. De kwetsbare periode van de voortplanting loopt van april t/m september, de kwetsbare periode van de winterrust van november t/m maart. Dit betekent dat werkzaamheden waarschijnlijk het beste kunnen worden uitgevoerd in oktober. Voer werkzaamheden stap voor stap uit zodat de noordse woelmuis de ruimte heeft om zich op andere plekken te verstoppen en voedsel te vinden. Raadpleeg voor meer informatie het kennisdocument over deze soort op de website van BIJ12.
Oehoe	Vogel	De oehoe leeft in bossen en moerassen en jaagt regelmatig in agrarisch gebied. De oehoe broedt in steengroeves en bosjes.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de oehoe van januari tot en met augustus. De oehoe komt ieder jaar terug naar hetzelfde nest. Daarom zijn nesten jaarrond beschermd. Haal nesten van de oehoe nooit weg. In Flevoland zijn nesten jaarrond beschermd, tenzij in de omgeving voldoende geschikte plekken zijn om een nieuw nest te bouwen. Om dat vast te stellen is vaak vooraf extra onderzoek nodig. Kijk voor de regels over jaarrond beschermde nesten in de Omgevingsverordening van de provincie.
Oeverloper	Vogel	De oeverloper leeft en broedt op oevers met weinig begroeiing van zoet, maar ook wel van brak water.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de oeverloper is dat van half april tot eind augustus. In het broedseizoen zijn nesten beschermd.
Oeverwaluw	Vogel	De oeverwaluw leeft en broedt in steile wanden in de buurt van water, bijvoorbeeld steile rivieroever, maar ook zandhopen op bouwterreinen.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de oeverwaluw is dat van half april tot half september. De oeverwaluw broedt vaak op hetzelfde nest of in de directe omgeving. Daarom zijn nesten jaarrond beschermd, maar mogelijk zijn er uitzonderingen. Kijk voor de regels over jaarrond beschermde nesten in de Omgevingsverordening van de provincie.

Ondergrondse woelmuis	Zoogdier	De ondergrondse woelmuis komt vooral voor in kleinschalig cultuurlandschappen. De ondergrondse woelmuis houdt o.a. van een dichte gras- of kruidlaag en zoomvegetaties zoals bermen en bomenrijen maar ook van boomgaarden en tuinen.	In alle provincies geldt voor de ondergrondse woelmuis het hele jaar een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling, behalve in Friesland, Overijssel en Zuid-Holland. Niettemin geldt de zorgplicht. Houd daarom bij werkzaamheden rekening met het behoud van het leefgebied van de ondergrondse woelmuis. Dit kan bijvoorbeeld door het in stand houden, aanleggen of extensief beheren van kleine landschapselementen zoals houtwallen met ondergroei en graften (een mini-terras op een helling, meestal begroeid met struikgewas).
Ooievaar	Vogel	De ooievaar leeft in allerlei gebieden zoals graslanden en uiterwaarden met een hoge waterstand. De ooievaar broedt op kunstnesten, in (oude) bomen en soms op (schoorstenen van) gebouwen.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de ooievaar is dat van maart (soms begin februari) tot eind juli (soms half augustus). De ooievaar komt ieder jaar terug naar hetzelfde nest. Daarom zijn de nesten jaarrond beschermd. In Drenthe geldt een uitzondering, daar zijn nesten alleen in het broedseizoen beschermd. In Flevoland geldt ook een uitzondering, daar mogen bij werkzaamheden in een hoogspanningsmast buiten het broedseizoen nesten worden weggehaald als in de omgeving voldoende alternatieven zijn.
Oostelijke witsnuitlibel	Andere diersoort dan vogels of zoogdieren	De oostelijke witsnuitlibel is een libelle en leeft in vennen en voedselarme heldere plassen.	Zorg voor een goede waterkwaliteit en voorkom verdroging in het gebied waar de oostelijke witsnuitlibel leeft.
Orpheusspotvogel	Vogel	De orpheusspotvogel leeft en broedt in allerlei gebieden met veel struiken zoals tuinen, parken, bosjes, boomgaarden en moerassen. Vaak zijn deze gebieden zonnig gelegen.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de orpheusspotvogel is dat van half mei tot eind augustus. Dan zijn nesten beschermd.
Otter	Zoogdier	De otter leeft langs de oevers van allerlei soorten water zoals meren, plassen, rivieren, kanalen en moerassen. Voorwaarden zijn dat de otter zich kan verstoppen en dat er rust heerst. Otters kunnen zich jaarrond voortplanten.	Houd bij werkzaamheden rekening met het behoud van het leefgebied van de otter. Probeer otters niet te verstoren waardoor ze plotseling de weg oversteken en er verkeersslachtoffers kunnen vallen. Bij werkzaamheden in het riet is het belangrijk dat er altijd iemand voor de werkzaamheden uit loopt om eventueel aanwezig otters te waarschuwen en slachtoffers te voorkomen.

Paapje	Vogel	Het paapje leeft en broedt in open gebieden met veel uitkijkposten zoals bosjes, paaltjes en lage boompjes. Vaak zijn dit heidegebieden, hoogveen of graslanden langs beken en rivieren.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor het paapje is dat van half april tot eind augustus. Dan zijn nesten beschermd. Het paapje broedt vaak op hetzelfde nest. In Limburg, Drenthe en Friesland geldt daarom een uitzondering. Hier mogen deze nesten nooit weggehaald worden, tenzij in de omgeving voldoende geschikte plekken zijn om een nieuw nest te bouwen. Om dat vast te stellen is vaak vooraf extra onderzoek nodig.
Patrijs	Vogel	De patrijs leeft en broedt in kruidenrijke (randen van) akkers en graslanden.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de patrijs is dat van eind maart tot eind oktober. Dan zijn nesten beschermd. In Gelderland geldt een uitzondering, daar zijn nesten jaarrond beschermd tenzij in de omgeving voldoende geschikte plekken zijn om een nieuw nest te bouwen. Om dat vast te stellen is vaak vooraf extra onderzoek nodig. Kijk voor de regels over jaarrond beschermde nesten in de Omgevingsverordening van de provincie.
Pijlscheefkelk	Plant	De pijlscheefkelk groeit in mergelgroeven en op oude stadsmuren en hellingen waar veel kalk in de grond zit.	Voorkom beschadiging van de pijlscheefkelk bij het herstellen van muren en gebruik zacht, kalkrijk materiaal om muren te voegen. Hiermee wordt (her-)vestiging van de pijlscheefkelk bevorderd.
Pijlstaart	Vogel	De pijlstaart leeft en broedt bij voorkeur in open gebieden, zoals grasland, met ondiepe wateren. De pijlstaart bouwt zijn nest op de oevers of de eilandjes in het ondiepe water, vaak is dit bij de kust.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de pijlstaart is dat van april tot eind augustus. Dan zijn nesten beschermd.
Pimpelmees	Vogel	De pimpelmees leeft en broedt in loofbos en gemengd bos, maar komt ook veel voor in parken, tuinen en houtwallen. De pimpelmees broedt vaak in nestkasten, holttes in bomen en soms ook kieren en spelten van gebouwen, bijvoorbeeld in spouwmuren.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de pimpelmees is dat van half maart tot eind juni (soms half juli). Dan zijn nesten beschermd. De pimpelmees broedt vaak op hetzelfde nest of in de directe omgeving. In Noord-Brabant, Zuid-Holland, Noord-Holland, Zeeland, Gelderland en Utrecht geldt daarom een uitzondering. Hier mogen deze nesten nooit weggehaald worden, tenzij in de omgeving voldoende geschikte plekken zijn om een nieuw nest te bouwen. Om dat vast te stellen is vaak vooraf extra onderzoek nodig.

Pimpernelblauwtje	Andere diersoort dan vogels of zoogdieren	Het pimperlblauwtje is een vlinder en leeft op natte graslanden waar ook de grote pimperl voorkomt.	Houd bij werkzaamheden rekening met het behoud van het leefgebied van het pimperlblauwtje.
Platte schijfhoren	Andere diersoort dan vogels of zoogdieren	De platte schijfhoren is een slak en leeft in zoete, heldere, voedselrijke wateren met een rijke onderwatervegetatie.	Houd bij werkzaamheden rekening met het behoud van het leefgebied van de platte schijfhoren.
Poelkikker	Andere diersoort dan vogels of zoogdieren	De poelkikker is een amfibie en leeft in voedselarm schoon water zoals poelen en vennen in laagveen en hoogveen. Voorwaarde is dat er voldoende dekking langs en op de oevers is. Poelkikkers komen eind maart uit hun winterslaap.	Vermijd werkzaamheden in de voortplantingsperiode en tijdens de winterrust. Voor de poelkikker betekent dit dat werkzaamheden het beste kunnen worden uitgevoerd in de periode van 1 augustus tot en met 15 oktober. Houd daarnaast bij werkzaamheden rekening met het behoud van het leefgebied van de poelkikker. Bijvoorbeeld door te zorgen voor schoon, niet verontreinigd oppervlaktewater met veel water- en oeverplanten zodat de poelkikker kan schuilen. Raadpleeg voor meer informatie het kennisdocument over deze soort op de website van BIJ12.
Porseleinhoen	Vogel	Het porseleinhoen leeft en broedt in gebieden met natte uiterwaarden, moerassen en natte graslanden. Belangrijk is dat het water niet dieper dan 15 cm is.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de porseleinhoen is dat van half april tot eind augustus. Dan zijn nesten beschermd.
Purperreiger	Vogel	De purperreiger leeft en broedt in natte gebieden met veel begroeiing van riet en/of struiken. De purperreiger vindt zijn voedsel in ondiep open water in moerassen en in graslanden met veel sloten.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de purperreiger is dat van half april tot half september. Dan zijn nesten beschermd. In Friesland geldt een uitzondering, daar zijn nesten jaarrond beschermd. Haal nesten van de purperreiger in Friesland nooit weg.
Putter	Vogel	De putter is een vogel en leeft in open bosgebieden, boomgaarden en parken. De putter heeft een voorkeur voor land dat niet wordt bewerkt met veel kruiden. De putter maakt zijn nest in struiken en bomen in allerlei landschappen.	Vermijd werkzaamheden in het broedseizoen; de periode wanneer het nest wordt gebouwd of wanneer eieren en/of jongen aanwezig zijn. Deze periode loopt voor de putter van half april (soms begin april) tot half september. In het broedseizoen zijn nesten beschermd.

Raaf	Vogel	De raaf leeft in grote bos- en heidegebieden en steeds vaker in bosjes in cultuurlandschap. De raaf broedt vooral in dennenbossen waar het rustig is.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de raaf is dat van begin februari tot half juni (soms eind juni). In Limburg, Overijssel, Drenthe en Friesland zijn nesten jaarrond beschermd. In de andere provincies ook, tenzij in de omgeving voldoende geschikte plekken zijn om een nieuw nest te bouwen. Om dat vast te stellen is vaak vooraf extra onderzoek nodig. Kijk voor de regels over jaarrond beschermde nesten in de Omgevingsverordening van de provincie.
Ransuil	Vogel	De ransuil leeft en broedt in gebieden met bomen en bosjes, zoals boerenland, natuurgebieden, maar ook in dorpen. Ze jagen in gebieden met lage begroeiing zoals weilanden. Het nest wordt in een boom gebouwd en is vaak een oud kraaien- of eksternest.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de ransuil is dat van maart (soms eind februari) tot half augustus. De ransuil komt ieder jaar terug naar hetzelfde nest. Daarom zijn de nesten jaarrond beschermd. Haal nesten van de ransuil nooit weg.
Ree	Zoogdier	Het ree leeft vooral in bosachtige gebieden met open plekken en aangrenzende velden, maar ook in rietvelden, duinen en akkerbouwgebieden. Voorwaarden zijn dat er in de omgeving voldoende voedsel, dekking en rust aanwezig is.	In alle provincies geldt voor het ree het hele jaar een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling. Niettemin geldt de zorgplicht. Houd bij werkzaamheden rekening met het leefgebied van het ree, bijvoorbeeld door te proberen reeën niet te verstoren waardoor verkeersslachtoffers kunnen vallen.
Rietgors	Vogel	De rietgors leeft en broedt in vochtige gebieden met riet, hoog gras en lage bomen.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de rietgors is dat van half april (soms begin april) tot half augustus. Dan zijn nesten beschermd.
Rietzanger	Vogel	De rietzanger leeft en broedt in gebieden bij water met oud riet, zoals in moerassen en langs sloten en vaarten.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de rietzanger is dat van half april tot eind augustus. Dan zijn nesten beschermd.

Ringmus	Vogel	De ringmus leeft in agrarische landschappen met veel bomen en dan vooral bij huizen aan de rand van dorpen en bij boerderijen. De ringmus broedt onder andere in holtes van bomen, in schuren, onder dakpannen en in nestkasten.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de ringmus is dat van begin maart tot half augustus (soms eind augustus). Dan zijn nesten beschermd. In Drenthe en Friesland zijn nesten jaarrond beschermd. In Overijssel en Limburg ook, maar mogelijk zijn er uitzonderingen. Kijk voor de regels over jaarrond beschermde nesten in de Omgevingsverordening van de provincie.
Ringslang	Andere diersoort dan vogels of zoogdieren	De ringslang is een reptiel en leeft in moeras, bij beken en in sloten. De ringslang komt niet alleen voor in natuurgebieden maar ook in agrarisch en stedelijk gebied.	Houd bij werkzaamheden rekening met het behoud van het leefgebied van de ringslang. Leg bijvoorbeeld broeihopen aan, deze bestaan uit een mengsel van lagen (paarden)mest, bladeren, compost en dikkere takken. Deze broeihopen leveren een belangrijke bijdrage aan het broedsucces van de ringslang (www.broeihopen.nl).
Rivierdonderpad	Andere diersoort dan vogels of zoogdieren	De rivierdonderpad is een vis en leeft in rivieren, beken, meren, kanalen, vaarten en grachten. De rivierdonderpad is vooral 's nachts actief, overdag schuilen ze tussen basaltblokken, stenen, oeverbeschoeiing en andere beschutting zoals boomwortels.	Vermijd werkzaamheden in de kwetsbare periode. Voor de rivierdonderpad is dit de voortplantingsperiode. Deze begint als het vrouwtje in februari, maart of april haar eitjes legt en eindigt als de eitjes drie tot zes weken later uitkomen. Houd bij werkzaamheden rekening met het leefgebied van de rivierdonderpad. Bijvoorbeeld door te zorgen dat er plekken zijn waar de rivierdonderpad zich kan verstoppert.
Rivierprik	Andere diersoort dan vogels of zoogdieren	De rivierprik is een vis en leeft langs de kust en in gebieden waar rivieren en beken in zee stromen. Het is een trekvis die in zout water leeft en zich, ver landinwaarts, voortplant in zoet water. De larven groeien daarop in de bodem.	Vermijd werkzaamheden in de voortplantings- en opgroeiperiode. Voor de rivierprik betekent dit dat werkzaamheden het beste kunnen worden uitgevoerd in de periode van september tot en met januari. Houd bij werkzaamheden rekening met het behoud van het leefgebied van de rivierprik. Bijvoorbeeld door te zorgen voor een, liefst open, verbinding tussen rivieren en de zee in het gebied waar de rivierprik leeft.
Rivierrombout	Andere diersoort dan vogels of zoogdieren	De rivierrombout is een libelle en leeft in de buurt van de grote rivieren. De larve leeft ingegraven in de bodem van de rivier en verlaat zijn huid vaak op een van de zandstrandjes langs de rivier. Dit noemen we uitsluipen.	Voorkom veranderingen aan de waterbodem en aantasting van de waterkwaliteit. Pas op dat bij werkzaamheden in de rivier de larven van de rivierrombout niet worden gedood.

Rode koekoekshommel	Andere diersoort dan vogels of zoogdieren	De rode koekoekshommel is een insect en komt op allerlei plekken voor, mits de steenhommel (gastheer) aanwezig is. De rode koekoekshommel heeft een voorkeur voor halfopen landschap.	Maai gefaseerd en zo laat mogelijk in het gebied waar de rode koekoekshommel leeft. Laat distels staan.
Rode wouw	Vogel	De rode wouw leeft en broedt in halfopen, laag gelegen of heuvelachtig bosrijke gebieden, het liefst in combinatie met landbouwgebieden met weinig vee of met heidegebieden.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de rode wouw is dat van half maart (soms eerste helft maart) tot eind augustus. Dan zijn nesten beschermd. In Limburg en Drenthe gelden uitzonderingen, daar zijn nesten jaarrond beschermd. Haal nesten van de rode wouw daar nooit weg. In Flevoland zijn nesten jaarrond beschermd, tenzij in de omgeving voldoende geschikte plekken zijn om een nieuw nest te bouwen. Om dat vast te stellen is vaak vooraf extra onderzoek nodig.
Roek	Vogel	De roek leeft vooral in gebieden die bestaan uit vochtige gras- en bouwlanden met verspreid staande groepjes bomen. De roek broedt in hoge bomen in groepen (kolonies) die meestal uit enkele tienstallen nesten bestaan.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de roek is dat van begin maart (soms begin februari) tot eind juni (soms eind juli). De roek broedt in groepen en is zeer honkvast. Daarom zijn de nesten jaarrond beschermd. Haal nesten van de roek nooit weg. Raadpleeg voor meer informatie het kennisdocument over deze soort op de website van BIJ12.
Roerdomp	Vogel	De roerdomp leeft en broedt in gebieden met riet dat ouder is dan een jaar (overjarig riet), vaak in moerassen of andere waterrijke gebieden met veel riet.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de roerdomp is dat van maart tot eind augustus. Dan zijn nesten beschermd. In Limburg geldt een uitzondering. Daar zijn de nesten het jaarrond beschermd tenzij in de omgeving voldoende alternatief leefgebied aanwezig is. Om dat vast te stellen is vooraf extra onderzoek nodig.
Rood peperboompje	Plant	Het rood peperboompje groeit in bossen en tussen struiken op plekken waar veel kalk in de grond zit.	Houd in het gebied waar het rood peperboompje voorkomt bossen open, dan kan er licht op de bodem komen.
Roodborst	Vogel	De roodborst leeft en broedt in struiken, struikgewas en bos. In de winter leeft de roodborst ook in stadstuinen.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de roodborst is dat van half maart tot eind juli (soms half augustus). Dan zijn nesten beschermd.

Roodborsttapuit	Vogel	De roodborsttapuit leeft en broedt in allerlei soorten open gebieden zoals heideterreinen, boerenland met greppels en struikjes, wegbermen met ruige begroeiing en aan de randen van steden op braakliggende grond.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de roodborsttapuit is dat van half maart tot half augustus. Dan zijn nesten beschermd.
Roodhalsfuut	Vogel	De roodhalsfuut leeft en broedt vooral in gebieden met vrij kleine ondiepe wateren met veel (drijvende) planten.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de roodhalsfuut is dat van maart tot half september. Dan zijn nesten beschermd.
Roodmus	Vogel	De roodmus leeft en broedt vooral in duinen, maar is af en toe ook te vinden in moerasgebieden met veel wilgen.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de roodmus is dat van mei tot half augustus. Dan zijn nesten beschermd.
Roodrandzandbij	Andere diersoort dan vogels of zoogdieren	De roodrandzandbij is een insect en leeft in open polderlandschap met dijken, in vochtig bos en struweel en op grasland.	Zorg voor voldoende bloem aanbod, bijvoorbeeld door in het voorjaar wilgen gefaseerd te knotten, in het gebied waar de roodrandzandbij leeft.
Rosse woelmuis	Zoogdier	De rosse woelmuis leeft bij voorkeur in loof- en gemengd bos met daaronder struiken of kruiden. Verder leven ze o.a. in houtwallen, heggen, bosranden en parken.	In alle provincies geldt voor de rosse woelmuis het hele jaar een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling. Niettemin geldt de zorgplicht. Vermijd daarom werkzaamheden in de kwetsbare periode. Voor de rosse woelmuis is dit het voortplantingsseizoen. Deze begint in februari-april en loopt door tot september-oktober. Houd daarnaast bij werkzaamheden rekening met het behoud van het leefgebied van de rosse woelmuis, bijvoorbeeld door het behouden en/of aanleggen van bosjes met struiken.
Rozenkransje	Plant	Het rozenkransje groeit in laagblijvende graslanden in zeeduin en op heide waar ook veel korstmossen groeien.	Voer in het gebied waar het rozenkransje voorkomt zo min mogelijk werkzaamheden uit. Bijvoorbeeld door het onderhoud te beperken. Houd andere planten en struiken klein, bijvoorbeeld door te maaien, dan wordt het rozenkransje niet overgroeid.

Rugstreeppad	Andere diersoort dan vogels of zoogdieren	De rugstreeppad is een amfibie en leeft o.a. in duingebieden, op braakliggend bouwterrein, in zandafgravingen en wateren met een tijdelijk karakter. Het is een pioniersoort, dat betekent dat de rugstreeppad zich vaak ergens als eerste vestigt.	Vermijd werkzaamheden in de kwetsbare periode. Voor de rugstreeppad zijn dit de voortplantingsperiode en de winterrust. Dit betekent dat werkzaamheden het beste kunnen worden uitgevoerd in de periode van 1 augustus tot 15 oktober. Let er bij grondwerkzaamheden op dat de rugstreeppad niet wordt op- of ingegraven. Houd daarnaast bij werkzaamheden rekening met het behoud van het leefgebied. Bijvoorbeeld door te zorgen voor tijdelijk water of door aanleg van puin, steen- en zandhopen. Raadpleeg voor meer informatie het kennisdocument over deze soort op de website van BIJ12.
Ruige dwergvleermuis	Zoogdier	De ruige dwergvleermuis kan overal voorkomen. Overdag verblijft de ruige dwergvleermuis in gebouwen achter betimmeringen, achter daklijsten, onder dakbedekking en op zolders. Ook komen ze voor in spleten en gaten in bomen.	Dit gebouw kan door de ruige dwergvleermuis worden gebruikt als paarverblijfplaats. Behoud openingen in gebouwen en voorkom verlichting van het leefgebied. Raadpleeg voor meer informatie het kennisdocument over deze soort op de website van BIJ12. Let op! Het gebouw kan door de ruige dwergvleermuis ook voor andere functies dan paarverblijfplaats worden gebruikt. Bovendien is niet uitgesloten dat er ook andere vleermuissoorten voorkomen in dit gebouw.
Ruw parelzaad	Plant	Ruw parelzaad groeit in bermen, op akkers, omgespitte- en braakliggende grond en langs spoorwegen en de waterkant.	Voer zo min mogelijk werkzaamheden uit, bijvoorbeeld door niet te maaien, als ruw parelzaad bloeit. Deze periode loopt van maart tot en met juli. Voer werkzaamheden in de bodem bij voorkeur uit als de zaden rijp zijn. Voor ruw parelzaad begint deze periode meestal in augustus. Hierdoor kunnen nieuwe planten makkelijker kiemen.
Scherpkruid	Plant	Scherpkruid groeit op erven en akkers, in zeeduin en langs heggen.	Voer zo min mogelijk werkzaamheden uit, bijvoorbeeld door onderhoud te beperken, als scherpkruid bloeit. Deze periode loopt van april tot en met juli.

Scholekster	Vogel	De scholekster leeft en broedt in allerlei open gebieden aan de kust, zoals kwelders, maar ook in het binnenland op akkers, op graslanden en in stedelijk gebied, daar broedt de scholekster op platte grinddaken.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de scholekster is dat van half maart tot half augustus. De scholekster broedt vaak op hetzelfde nest of in de directe omgeving. Daarom zijn nesten in Drenthe en Friesland jaarrond beschermd, tenzij in de omgeving voldoende geschikte plekken zijn om een nieuw nest te bouwen. Om dat vast te stellen is vaak vooraf extra onderzoek nodig. Kijk voor de regels over jaarrond beschermde nesten in de Omgevingsverordening van de provincie.
Schubvaren	Plant	De schubvaren groeit op oude vochtige muren, bijvoorbeeld op tuinmuren of kademuren.	Voorkom beschadiging van de schubvaren bij het herstellen van muren en gebruik zacht, kalkrijk materiaal om muren te voegen. Hiermee wordt (her-)vestiging van de schubvaren bevorderd.
Schubzegge	Plant	De schubzegge groeit in moerassen waar veel kalk in het water zit.	Ga in het gebied waar de schubzegge voorkomt verdroging tegen en voorkom dat er mest (fosfaat) in het water komt.
Sierlijke witsnuitlibel	Andere diersoort dan vogels of zoogdieren	De sierlijke witsnuitlibel is een libelle en leeft in helder water met veel waterplanten.	Voorkom verslechtering van de waterkwaliteit of vertroebeling van het water in het gebied waar de sierlijke witsnuitlibel leeft.
Sijs	Vogel	De sijs leeft vooral in naaldbomen en broedt in naaldbossen met sparren.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de sijs is dat van half maart tot half juli. Dan zijn nesten beschermd.
Slechtvalk	Vogel	De slechtvalk leeft in allerlei soorten gebieden zoals boerenland, uitwaarden en kwelders. De slechtvalk broedt onder andere op kantoorgebouwen en hoge torens in steden, in open boerenland en in hoogspanningsmasten.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de slechtvalk is dat van februari tot eind juli. De slechtvalk komt ieder jaar terug naar hetzelfde nest. Daarom zijn nesten jaarrond beschermd. Haal nesten van de slechtvalk nooit weg.
Sleedoornpage	Andere diersoort dan vogels of zoogdieren	De sleedoornpage is een vlinder en leeft op sleedoornstruiken en soms op pruimenbomen en komt relatief vaak voor in de bebouwde kom. Als er geen sleedoornstruik of pruim staat, dan komt de Sleedoornpage niet voor.	Snoei sleedoornstruiken waar sleedoornpages kunnen zitten in delen. Dan is elke winter een deel niet gesnoeid en hebben de eitjes van de sleedoornpage een plek om te overleven.

Slobeend	Vogel	De slobeend leeft en broedt in gebieden met ondiep open water of met nat grasland.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de slobeend is dat van half maart tot eind juli (soms half augustus). Dan zijn nesten beschermd.
Smalle raai	Plant	De smalle raai groeit vooral langs spoorwegen, in graanakkers waar veel kalk in de grond zit en op droge omgewerkte grond.	Voer zo min mogelijk werkzaamheden uit, bijvoorbeeld door onderhoud te beperken, als de smalle raai bloeit. Deze periode loopt van juni tot en met september. Voer werkzaamheden in de bodem bij voorkeur uit als de zaden rijp zijn. Voor de smalle raai begint deze periode meestal ook in september. Hierdoor kunnen nieuwe planten makkelijker kiemen.
Smient	Vogel	De smient leeft en broedt in gebieden met grasland en (ondiep) open water met veel begroeiing op de oevers.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de smient is dat van half april tot half augustus. Dan zijn nesten beschermd.
Snor	Vogel	De snor leeft en broedt in gebieden met nat riet dat ouder is dan een jaar (overjarig riet).	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de snor is dat van half april tot half augustus. Dan zijn nesten beschermd.
Spaanse vlag	Andere diersoort dan vogels of zoogdieren	De Spaanse vlag is een vlinder en leeft op de overgang van bos en struikgewas en/of grasland, vaak op vochtige plekken.	Laat bij maaiwerkzaamheden in een gebied waar de Spaanse vlag leeft een rand langs het struikgewas staan, zodat een geleidelijke overgang van het grasland naar het struikgewas behouden blijft.
Speerwaterjuffer	Andere diersoort dan vogels of zoogdieren	De speerwaterjuffer is een insect en leeft in zwak gebufferde venen met een zone van draad- of snavelzegge en duizendknoopfonteinkruid.	Zorg voor het behoud van de zone met zegge en duizendknoopfonteinkruid. Het ven mag niet verdrogen.
Sperwer	Vogel	De sperwer leeft in allerlei landschappen. De sperwer broedt in bossen en in bosjes op het boerenland, maar soms ook in tuinen, parken en op erven.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de sperwer is dat van april tot eind augustus. Dan zijn nesten beschermd. In Limburg geldt een uitzondering. Daar zijn de nesten het jaarrond beschermd tenzij in de omgeving voldoende alternatief leefgebied aanwezig is. Om dat vast te stellen is vooraf extra onderzoek nodig.
Spiegeldikkopje	Andere diersoort dan vogels of zoogdieren	Het spiegeldikkopje is een vlinder en leeft in vochtige ruigten of op open plekken in het bos met pijpenstrootje of hennegras.	Houd bij werkzaamheden rekening met het behoud van het leefgebied van het spiegeldikkopje.

Spits havikskruid	Plant	Spits havikskruid groeit in bermen, bossen, bosranden en graslanden, op braakliggende akkers en langs rivierdijken en spoorwegen.	Voer zo mijn mogelijk werkzaamheden uit in het gebied waar spits havikskruid voorkomt. Bijvoorbeeld door het onderhoud te beperken. Maai als de zaden zijn afgezet. Voor spits havikskruid begint deze periode meestal begin augustus.
Spotvogel	Vogel	De spotvogel leeft en broedt in allerlei soorten gebieden met bosjes en struiken, zoals parken, grote tuinen, randen van loofbos en boomgaarden.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de spotvogel is dat van mei tot half augustus (soms eind augustus). In Limburg geldt een uitzondering. Daar zijn de nesten het jaarrond beschermd tenzij in de omgeving voldoende alternatief leefgebied aanwezig is. Om dat vast te stellen is vooraf extra onderzoek nodig.
Spreeuw	Vogel	De spreeuw leeft in allerlei gebieden, meestal in de buurt van bebouwing en graslanden, soms in bossen en dan vooral aan de (bos)randen. De spreeuw broedt onder andere in holttes van bomen, in schoorstenen van gebouwen en in nestkasten.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de spreeuw is dat van half maart tot begin juli (soms tweede helft juli). Nesten zijn jaarrond beschermd, tenzij in de omgeving voldoende geschikte plekken zijn om een nieuw nest te bouwen. Om dat vast te stellen is vaak vooraf extra onderzoek nodig. Kijk voor de regels over jaarrond beschermde nesten in de Omgevingsverordening van de provincie. In Limburg geldt een uitzondering, daar zijn nesten alleen in het broedseizoen beschermd.
Sprinkhaanzanger	Vogel	De sprinkhaanzanger leeft en broedt onder andere in rietvelden, moerassen en andere drassige gebieden. Belangrijk is dat ze zich er kunnen verstoppen.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de sprinhaanzanger is dat van half april tot eind augustus. Dan zijn nesten beschermd.
Staartmees	Vogel	De staartmees leeft vooral in gebieden met bomen en struiken. De staartmees broedt in parken, tuinen en houtwallen, op begraafplaatsen en in gevarieerde bossen.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de staartmees is dat van half maart tot eind juni. Dan zijn nesten beschermd.

Steenmarter	Zoogdier	De steenmarter leeft in Nederland op verschillende soorten plekken, maar is vooral te vinden in de buurt van dorpen, boerderijen en (zelfs in) grote steden. De steenmarter is vooral 's nachts actief.	Dit hebben we ervan gemaakt: Vermijd werkzaamheden in de kwetsbare periode. Voor de steenmarter is dit de periode dat de jongen worden geboren en bij de moeder blijven. Deze periode loopt van maart tot en met juli. In Friesland geldt voor de steenmarter het hele jaar een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling. In Limburg geldt van 15 augustus tot en met eind februari een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling of bestendig beheer en onderhoud. Deze vrijstelling geldt niet voor het doden van steenmarters. Kijk voor meer informatie in de Omgevingsverordening van de provincie.
Steenuil	Vogel	De steenuil komt vooral voor op erven van (voormalige) boerderijen en broedt daar meestal onder het dak of in een schuurtje. Sommige steenuilen broeden in de holten van knotwilgen.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de steenuil is dat van april (soms eind maart) tot eind augustus. De steenuil gebruikt zijn nest het hele jaar ook als rustplek. Daarom zijn de nesten jaarrond beschermd. Haal nesten van de steenuil nooit weg. Raadpleeg voor meer informatie het kennisdocument over deze soort op de website van BIJ12.
Stenophylax permistus	Andere diersoort dan vogels of zoogdieren	Stenophylax permistus is een insect en leeft in de buurt van tijdelijk stromend water en kwelders met veel vegetatie.	Zorg voor een natuurlijk peilbeheer in het gebied waar stenophylax permistus leeft.
Stijve wolfsmelk	Plant	De stijve wolfsmelk groeit op akkers en kaalgekapte bospercelen, in bermen en bosranden en langs heggen, waterkanten en dijken. De plekken waar de stijve wolfsmelk groeit zijn meestal open en er zit veel kalk in de grond.	Voer zo min mogelijk werkzaamheden uit, bijvoorbeeld door het onderhoud te beperken, in het gebied waar de stijve wolfsmelk groeit. Voer werkzaamheden in de bodem bij voorkeur uit als de zaden rijp zijn. Voor stijve wolfsmelk begint deze periode in september. Hierdoor kunnen nieuwe planten makkelijker kiemen.
Stofzaad	Plant	Stofzaad groeit in bossen en zeeduinen.	Voer zo min mogelijk werkzaamheden uit in het gebied waar stofzaad voorkomt. Bijvoorbeeld door het onderhoud te beperken.
Stormmeeuw	Vogel	De stormmeeuw leeft en broedt vooral langs de kust in gebieden met open duinen, strandvlaktes, kwelders, maar ook op gebouwen en opslagterreinen. De stormmeeuw broedt in kolonies.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de stormmeeuw is dat van april tot eind augustus. Dan zijn nesten beschermd. In Friesland geldt een uitzondering, daar zijn nesten jaarrond beschermd. Haal nesten van de stormmeeuw in Friesland nooit weg.

Strandplevier	Vogel	De strandplevier leeft en broedt in gebieden met kiezel- en zandstranden en ingedroogde moddervlaktes. Meestal aan de kust, maar ook in het binnenland.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de strandplevier is dat van april tot eind augustus. Dan zijn nesten beschermd. In Friesland zijn nesten jaarrond beschermd, tenzij in de omgeving voldoende geschikte plekken zijn om een nieuw nest te bouwen. Om dat vast te stellen is vaak vooraf extra onderzoek nodig. Kijk voor de regels over jaarrond beschermde nesten in de Omgevingsverordening van de provincie.
Tafeleend	Vogel	De tafeleend leeft en broedt in gebieden met meren, moerassen en langzaam stromende rivieren met begroeiing op de oevers.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de tafeleend is dat van half april tot half september. Dan zijn nesten beschermd.
Taigaboomkruiper	Vogel	De taigaboomkruiper (kortsnavelboomkruiper) leeft en broedt vooral in gebieden met oude (gemengde) loofbossen met struiken en dood hout en/of los schors.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de taigaboomkruiper (kortsnavelboomkruiper) is dat van april tot eind augustus. Dan zijn nesten beschermd. In Noord en Zuid-Holland, Overijssel, Gelderland, Flevoland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg zijn nesten jaarrond beschermd, tenzij in de omgeving voldoende geschikte plekken zijn om een nieuw nest te bouwen. Om dat vast te stellen is vaak vooraf extra onderzoek nodig. Kijk voor de regels over jaarrond beschermde nesten in de Omgevingsverordening van de provincie.
Tapuit	Vogel	De tapuit leeft in gebieden met (korte) begroeiing en kale plekken met zand, vaak zijn dat open duin, heide- of stuifzandgebieden. De tapuit broedt in holten in de bodem.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de tapuit is dat van april tot eind juli (soms half augustus). Dan zijn nesten beschermd. In Flevoland, Overijssel, Noord-Brabant, Zuid-Holland, Noord-Holland, Zeeland, Gelderland en Utrecht zijn nesten jaarrond beschermd, tenzij in de omgeving voldoende geschikte plekken zijn om een nieuw nest te bouwen. Om dat vast te stellen is vaak vooraf extra onderzoek nodig. Kijk voor de regels over jaarrond beschermde nesten in de Omgevingsverordening van de provincie.

Tengere distel	Plant	De tengere distel groeit op bouw- en haventerreinen, in bermen en zeeduin en langs dijken.	Voer zo min mogelijk werkzaamheden uit, bijvoorbeeld door onderhoud te beperken, als de tengere distel bloeit. Deze periode loopt van april tot en met augustus. Laat schapen in het gebied lopen, dit bevordert de verspreiding van het zaad van de tengere distel.
Tengere veldmuur	Plant	De tengere veldmuur groeit op akkers, rotsachtige plekken in grasland en steile hellingen op grond waar veel kalk in zit. Soms groeit de tengere veldmuur tussen stoeptegels.	Voer zo min mogelijk werkzaamheden uit, bijvoorbeeld door onderhoud te beperken, als de tengere veldmuur bloeit. Deze periode loopt van mei tot en met juni
Teunisbloempijlstaart	Andere diersoort dan vogels of zoogdieren	De teunisbloempijlstaart is een vlinder en leeft op allerlei soorten bloemen. De rups leeft op voedselrijke natte plekken maar ook op verstoorde zandige plekken met teunisbloemen en harig wilgenroosjes.	Laat teunisbloemen en harig wilgenroosje in de periode juni - september staan of controleer ze op de aanwezigheid van rupsen van de teunisbloempijlstaart.
Tjiftjaf	Vogel	De tjiftjaf leeft en broedt in gebieden met bomen en struiken zoals parken, gemengde bossen en loofbossen.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de tjiftjaf is dat van april tot half augustus. Dan zijn nesten beschermd.
Torenvalk	Vogel	De torenvalk leeft vooral in open gebieden waar veel muizen voorkomen. De torenvalk broedt onder andere in nestkasten, losstaande bomen en aan de rand van bos en bosjes, vaak is het dan in oude kraaien- of eksterneesten.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de torenvalk is dat van maart tot eind augustus. In Flevoland, Limburg, Overijssel en Friesland zijn nesten jaarrond beschermd. In de andere provincies ook, tenzij in de omgeving voldoende geschikte plekken zijn om een nieuw nest te bouwen. Om dat vast te stellen is vaak vooraf extra onderzoek nodig. Kijk voor de regels over jaarrond beschermde nesten in de Omgevingsverordening van de provincie.
Trosgamander	Plant	De trosgamander groeit op grasland, akkers en rotsachtige plaatsen.	Voer zo min mogelijk werkzaamheden uit, bijvoorbeeld door onderhoud te beperken, als de trosgamander bloeit. Deze periode loopt van juni tot en met oktober.
Tuinfluitier	Vogel	De tuinfluitier leeft en broedt in gebieden met veel begroeiing van struiken, zoals parken, tuinen, bosranden en houtwallen.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de tuinfluitier is dat van half april tot half augustus (soms eind augustus). Dan zijn nesten beschermd.

Tureluur	Vogel	De tureluur leeft en broedt onder andere op natte weilanden, in kwelders en in moerassen.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de tureluur is dat van half maart tot eind juli. Dan zijn nesten beschermd. In Overijssel en Gelderland zijn nesten jaarrond beschermd, maar mogelijk gelden er uitzonderingen. Kijk voor de regels over jaarrond beschermde nesten in de Omgevingsverordening van de provincie
Turkse tortel	Vogel	De Turkse tortel leeft en broedt vooral in tuinen, parken, steden en op boerenerven.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de Turkse tortel is dat van half februari (soms begin februari) tot eind november. Dan zijn nesten beschermd.
Veenbesblauwtje	Andere diersoort dan vogels of zoogdieren	Het veenbesblauwtje is een vlinder en leeft in hoogvenen waar ook de kleine veenbes voorkomt.	Houd bij werkzaamheden rekening met het behoud van het leefgebied van het veenbesblauwtje.
Veenbesparelmoervlinder	Andere diersoort dan vogels of zoogdieren	Het veenbesparelmoervlinder is een vlinder en leeft in hoogvenen waar ook de kleine veenbes voorkomt.	Houd bij werkzaamheden rekening met het behoud van het leefgebied van de veenbesparelmoervlinder.
Veenbloembies	Plant	De veenbloembies groeit in hoogveengebieden.	Voer zo min mogelijk werkzaamheden uit in het gebied waar veenbloembies voorkomt. Bijvoorbeeld door het onderhoud te beperken. Ga verdroging en plattrappen van het hoogveen tegen en voorkom dat er mest (fosfaat) in het water komt.
Veenhooibeestje	Andere diersoort dan vogels of zoogdieren	Het veenhooibeestje is een vlinder en leeft in hoogvenen met eenarig wollegras.	Houd bij werkzaamheden rekening met het behoud van het leefgebied van het Veenhooibeestje.
Veldleeuwerik	Vogel	De veldleeuwerik leeft en broedt in open gebieden met korte begroeiing, zoals heidevelden, akkers en graslanden.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de veldleeuwerik is dat van half maart tot eind juli (soms half augustus). Dan zijn nesten beschermd. In Overijssel en Gelderland zijn nesten jaarrond beschermd, maar mogelijk gelden er uitzonderingen. Kijk voor de regels over jaarrond beschermde nesten in de Omgevingsverordening van de provincie.

Veldmuis	Zoogdier	De veldmuis leeft in open gebieden met grassen en/of granen, zoals graanakkers, wegbermen, dijken, spoorwegtaluds, slootkanten, boomgaarden, graslanden en klavervelden. Ze hebben een voorkeur voor drogere gebieden met kort gras.	In alle provincies geldt voor de veldmuis het hele jaar een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling. Niettemin geldt de zorgplicht. Houd bij werkzaamheden rekening met het behoud van het leefgebied van de veldmuis, bijvoorbeeld door maaien te beperken en door te zorgen voor grasland met veel kruiden.
Veldparelmoervlinder	Andere diersoort dan vogels of zoogdieren	De veldparelmoervlinder is een vlinder en leeft in bloemrijke graslanden met een mozaïek van lage, open plekjes en grotere planten.	Voorkom het verlies van grasland en zorgen voor variatie in het gebied waar de veldparelmoervlinder leeft.
Velduil	Vogel	De velduil leeft en broedt in open landschappen, zoals duingebieden, moerassen, graslanden en akkers. De velduil komt vooral voor als er veel woelmuizen zijn.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de velduil is dat van half maart tot half september. Dan zijn nesten beschermd. In Gelderland geldt een uitzondering, daar zijn nesten jaarrond beschermd tenzij in de omgeving voldoende geschikte plekken zijn om een nieuw nest te bouwen. Om dat vast te stellen is vaak vooraf extra onderzoek nodig. Kijk voor de regels over jaarrond beschermde nesten in de Omgevingsverordening van de provincie.
Vierbandgroefbij	Andere diersoort dan vogels of zoogdieren	De vierbandgroefbij is een insect en leeft op bloemrijke droog grasland.	Maai zo laat mogelijk of anders gefaseerd in het gebied waar de vierbandgroefbij leeft.
Vierlijneendagsvlieg	Andere diersoort dan vogels of zoogdieren	Ephemera glaucops is een insect en leeft in schone, spaarzaam begroeide meren met een stevige (zand)bodem zoals plassen waar zand wordt gewonnen.	Zorg voor een goede waterkwaliteit in het gebied waar ephemera glaucops leeft.
Vink	Vogel	De vink leeft in allerlei landschappen. Voorwaarde is wel dat er een paar bomen en struiken staan. De vink broedt in loof- en naaldbossen, kleinere bosjes van loof- en naaldbomen, boomgaarden, parken en tuinen.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de vink is dat van april tot half augustus. Dan zijn nesten beschermd.

Vinpootsalamander	Andere diersoort dan vogels of zoogdieren	De vinpootsalamander is een amfibie en leeft op hogere (droge) zandgronden en in heuvellandschappen. Ze planten zich vooral voort in vennen, plassen en bospoelen. Vanaf half november tot half februari houden vinpootsalamanders een winterslaap.	Vermijd werkzaamheden in de voortplantingsperiode en tijdens de winterrust. Voor de vinpootsalamander betekent dit dat werkzaamheden in het water het beste kunnen worden uitgevoerd wanneer het water is drooggefallen of laag staat. Meestal is dit aan het eind van de zomer of in het najaar. Werkzaamheden op het land kunnen het beste worden uitgevoerd tussen half februari en half november. Houd bij werkzaamheden rekening met het behoud van het leefgebied van de vinpootsalamander. Bijvoorbeeld door te zorgen voor houtstronken of houtstapels om onder te overwinteren.
Visdief	Vogel	De visdief leeft en broedt langs de kust. Ze komen ook voor in het binnenland, bijvoorbeeld in waterrijke gebieden met grasland. De visdief broedt in kolonies.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de visdief is dat van half maart tot eind juli (soms half augustus). Dan zijn nesten beschermd. In Drenthe, Friesland en Limburg zijn nesten jaarrond beschermd maar mogelijk gelden er uitzonderingen. Kijk voor de regels over jaarrond beschermde nesten in de Omgevingsverordening van de provincie.
Vliegend hert	Andere diersoort dan vogels of zoogdieren	Het vliegend hert is een insect en leeft als larve in dood hout in o.a. bosranden, open bossen, tuinen en alleenstaande bomen die door witrotschimmel zijn aangetast. Larven en volwassen exemplaren hebben een zeer sterke voorkeur voor de inlandse eik.	Zorg voor voldoende natuurlijke, ongestoorde bossen en bosranden waarin ook op de lange termijn, voldoende oude kwijnende eiken, dode eikenbomen en open plekken aanwezig zijn.
Vliegenorchis	Plant	De vliegenorchis groeit in bosranden op grond waar veel kalk in zit.	Voer zo min mogelijk werkzaamheden uit, bijvoorbeeld door onderhoud te beperken, als de vliegenorchis bloeit. Deze periode loopt van april tot en met juli.
Vos	Zoogdier	De vos leeft in allerlei soorten gebieden, bijvoorbeeld in bossen en parken, heide en venen, duinen, polders en landbouwgebieden, maar ook aan de randen van of in dorpen en steden.	In alle provincies geldt voor de vos het hele jaar een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling. Niettemin geldt de zorgplicht. Houdt daarom bij werkzaamheden rekening met het behoud van het leefgebied van de vos. Zorg voor voldoende eten en plekken waar de vos zich kan verstoppen, bijvoorbeeld door muizen niet te bestrijden en door te zorgen voor begroeiing van verschillende hoogte.

Vroedmeesterpad	Andere diersoort dan vogels of zoogdieren	De vroedmeesterpad is een amfibie en leeft in een kale omgeving met hier en daar een poeltje. Ideaal zijn voormalige groeves en ruderaal terreinen. Ze zijn vooral 's nachts actief. Het is een pioniersoort, d.w.z. dat ze zich vaak als eerste vestigen.	Vermijd werkzaamheden in de voortplantingsperiode. Na de paring draagt het mannetje de bevruchte eitjes 3-7 weken met zich mee. Als de eitjes bijna uitkomen gaat het mannetje naar het water en kruipen de larven uit het ei. Omdat dit moment moeilijk is te voorspellen moet van plek tot plek worden bekeken wanneer werkzaamheden het beste kunnen worden uitgevoerd. Houd bij werkzaamheden rekening met het behoud van het leefgebied van de vroedmeesterpad. Bijvoorbeeld door te zorgen voor een kale (open) omgeving met poeltjes zodat ze zich kunnen voortplanten en stenen om zich onder te verstoppen.
Vroege ereprijs	Plant	Vroege ereprijs groeit op droge akkers met veel kalk in de grond en tussen het gras op rivierduinen.	Voer zo min mogelijk werkzaamheden uit, bijvoorbeeld door onderhoud te beperken, als vroege ereprijs bloeit. Deze periode loopt van maart tot en met mei. Voer werkzaamheden in de bodem bij voorkeur uit als de zaden rijp zijn. Voor vroege ereprijs begint deze periode meestal in juli. Hierdoor kunnen nieuwe planten makkelijker kiemen.
Vuurgoudhaan	Vogel	De vuurgoudhaan leeft en broedt in gemengde bossen en naaldbossen met veel sparren. Ook in tuinen en parken met sparren komen ze voor.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de vuurgoudhaan is dat van half april tot half september. Dan zijn nesten beschermd.
Vuursalamander	Andere diersoort dan vogels of zoogdieren	De vuursalamander is een amfibie en leeft in heuvelachtig, ongestoord landschap met loofbossen en beekjes met helder, koel, zuurstofrijk water. In de zomer zijn ze weinig actief. Overdag verstoppen ze zich onder stenen, dood hout en houtstapels.	De vuursalamander is zeer zeldzaam. Houd bij werkzaamheden altijd rekening met het behoud van het leefgebied van de vuursalamander. Neem voor maatwerk contact op met een specialist voor deze soort.
Waterhoen	Vogel	Het waterhoen leeft en broedt in gebieden met meren, plassen, rivieren, vijvers en sloten. Belangrijk is dat de oevers begroeid zijn met planten.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de waterhoen is dat van half maart (soms begin maart) tot eind augustus (soms half september). Dan zijn nesten beschermd.
Waterral	Vogel	De waterral leeft en broedt in gebieden met moeras, rivieren en meren. Belangrijk is dat er riet groeit.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de waterral is dat van half maart tot half september. Dan zijn nesten beschermd.

Watersnip	Vogel	De watersnip leeft en broedt op natte graslanden en moerassen.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de watersnip is dat van half maart tot eind september. Dan zijn nesten beschermd.
Waterspitsmuis	Zoogdier	De waterspitsmuis leeft bij beken, rivieren, sloten en plassen, maar bijvoorbeeld ook langs de binnenduinrand. Voorwaarde is dat de waterspitsmuis zich kan verstoppen en dat er binnen 500 meter water ligt.	Houd bij werkzaamheden rekening met het leefgebied van de waterspitsmuis, bijvoorbeeld door te zorgen voor voldoende planten in het water en een goede dekking op de oevers.
Weidesprinkhaan	Andere diersoort dan vogels of zoogdieren	De weidesprinkhaan is een sprinkhaan met een breed leefgebied, maar komt vooral voor in schrale graslanden en bermen.	Voorkom intensief beheer in het gebied waar de weidesprinkhaan leeft.
Wespendief	Vogel	De wespendif leeft vooral in gemengde bossen en loofbossen met open plekken, hoogvenen, heide en grasland. Belangrijk is dat er wespen voorkomen. De wespendif broedt in bossen of bosjes in half open landschap en bouwt zijn nest hoog in een boom.	Werk buiten het broedseizoen; de periode wanneer het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de wespendif is dat van mei tot half september. De wespendif komt ieder jaar terug naar hetzelfde nest. Daarom zijn de nesten jaarrond beschermd. Haal nesten van de wespendif nooit weg. In Flevoland zijn nesten jaarrond beschermd, tenzij in de omgeving voldoende geschikte plekken zijn om een nieuw nest te bouwen. Om dat vast te stellen is vaak vooraf extra onderzoek nodig. Kijk voor de regels over jaarrond beschermde nesten in de Omgevingsverordening van de provincie.
Wezel	Zoogdier	De wezel leeft in allerlei droge gebieden op het land zolang ze zich er maar kunnen verstoppen en er voldoende voedsel is. Ze wonen vaak in oude holen van muizen, ratten en konijnen.	Vermijd werkzaamheden in de kwetsbare perioden. Voor de wezel is dit de voortplantingsperiode die loopt van mei tot augustus en de perioden waarin het vriest. Probeer verstoring te voorkomen en houd bij werkzaamheden rekening met het leefgebied van de wezel, bijvoorbeeld door houtstapels te laten liggen en heggen aan te planten. In Groningen, Limburg en Zuid-Holland geldt voor de wezel een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling. Raadpleeg voor meer informatie het kennisdocument over deze soort op de website van BIJ12.
Wielewaal	Vogel	De wielewaal leeft vooral in gebieden met vochtig loofbos, vaak groeien er veel populieren. De wielewaal bouwt zijn nest in een takvork.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de wielewaal is dat van mei tot eind augustus. Dan zijn nesten beschermd.

Wilke averuit	Plant	De wilde averuit groeit in bermen en rivier- en zeeduinen, op dijken, grasland en braakliggende grond en langs spoorwegen.	Voer zo min mogelijk werkzaamheden uit, bijvoorbeeld door onderhoud te beperken, als de wilde averuit bloeit. Deze periode loopt van april tot en met juli. Zorg voor open plekken, bijvoorbeeld door te maaien, zodat nieuwe planten kunnen kiemen maar beschadig daarbij de rozetten niet.
Wilke eend	Vogel	De wilde eend leeft en broedt in gebieden met water waar veel voedsel in zit. De wilde eend eet zowel planten als dieren (omnivoor). Het water mag niet dieper dan een meter diep.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de wilde eend is dat van begin maart tot half augustus. Dan zijn nesten beschermd.
Wilke ridderspoor	Plant	Wilke ridderspoor groeit vooral op akkers maar soms ook op (andere) omgewerkte grond.	Voer zo min mogelijk werkzaamheden uit, bijvoorbeeld door onderhoud te beperken, als wilde ridderspoor bloeit. Deze periode loopt van mei tot en met oktober. Voer werkzaamheden in de bodem bij voorkeur uit als de zaden rijp zijn. Voor wilde ridderspoor begint deze periode voor sommige planten al in september. Hierdoor kunnen nieuwe planten makkelijker kiemen.
Wilke weit	Plant	De wilde weit groeit op grasland met veel kalk in de grond.	Voer zo min mogelijk werkzaamheden uit, bijvoorbeeld door onderhoud te beperken, als de wilde weit bloeit. Deze periode loopt van mei tot en met augustus. Voer werkzaamheden in de bodem bij voorkeur uit als de zaden rijp zijn. Voor de wilde weit begint deze periode meestal in september. Hierdoor kunnen nieuwe planten makkelijker kiemen.
Winterkoning	Vogel	De winterkoning leeft en broedt in allerlei gebieden met bomen en struiken. Ook in woonwijken met veel bomen, in duinen en in moerassen met veel struiken komen ze voor.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de winterkoning is dat van half maart tot half augustus. Dan zijn nesten beschermd.
Wintertaling	Vogel	De wintertaling leeft en broedt bij voorkeur in gebieden met ondiep, rustig water met veel begroeiing op de oevers.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de wintertaling is dat van april tot half september. Dan zijn nesten beschermd.
Witte kwikstaart	Vogel	De witte kwikstaart leeft in allerlei gebieden zoals akkers, parken, tuinen, stedelijk gebied, industrieterreinen en uitgestrekte weilanden. De witte kwikstaart broedt vaak in schuurtjes, onder bruggetjes en in slootkanten.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de witte kwikstaart is dat van half maart tot eind augustus. Dan zijn nesten beschermd.

Witwangstern	Vogel	De witwangstern leeft vooral in natte gebieden en heeft een voorkeur voor zoetwatermoerassen. Ook bij meren, rivieren, visvijvers, enz. komen ze voor. De witwangstern bouwt zijn nest vaak op drijvende waterplanten of tussen de planten op de oevers.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de witwangstern is dat van mei tot half juli (soms eind juli). Dan zijn nesten beschermd.
Wolfskers	Plant	Wolfskers groeit vooral in bossen, maar komt soms ook voor in parken en stedelijke gebieden.	Houd bossen open zodat wolfskers veel licht kan ontvangen en laat planten in de bebouwde kom staan.
Woudaap	Vogel	De woudaap leeft en broedt vooral in rietvelden die worden afgewisseld door stukjes open water. Het riet is meestal ouder dan een jaar (overjarig riet).	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de woudaap is dat van mei tot eind augustus. Dan zijn nesten beschermd.
Wrattenbijter	Andere diersoort dan vogels of zoogdieren	De wrattenbijter is een sprinkhaan en leeft op extensief beheerde akkers en zeer schrale heide en graslanden.	Houd bij werkzaamheden rekening met het behoud van het leefgebied van de wrattenbijter.
Wulp	Vogel	De wulp leeft en broedt in allerlei open gebieden, maar voornamelijk in duinen, heide en graslanden.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de wulp is dat van maart tot eind juli (half augustus). Dan zijn nesten beschermd. In Overijssel, Gelderland en Limburg zijn nesten jaarrond beschermd, maar mogelijk zijn er uitzonderingen. Kijk voor de regels over jaarrond beschermde nesten in de Omgevingsverordening van de provincie.
Zandhagedis	Andere diersoort dan vogels of zoogdieren	De zandhagedis is een reptiel en leeft in zandig, droog, open terrein zoals heide, op stuwwallen en in zee- en rivierduinen. Zandhagedissen ontwaken meestal eind maart uit hun winterslaap.	Vermijd werkzaamheden in de kwetsbare periodes. Voor de zandhagedis zijn dit de voortplantingsperiode en de winterrust. Dit betekent dat werkzaamheden die zowel effect hebben op de planten als op de bodem het beste kunnen worden uitgevoerd in de periode van 15 augustus tot 1 oktober. Houd daarnaast bij werkzaamheden rekening met het leefgebied. Bijvoorbeeld door te zorgen voor open zandige plekken waar ze zich kunnen voortplanten en het behoud van greppels en een afwisselende plantengroei. Raadpleeg voor meer informatie het kennisdocument over deze soort op de website van BIJ12.

Zandhommel	Andere diersoort dan vogels of zoogdieren	De zandhommel is een insect en leeft in open en vaak vochtig bloemrijk landschap.	Maai zo laat mogelijk en gefaseerd in het gebied waar de zandhommel leeft. Laat voor voldoende nestel- en overwinteringsplekken delen van de vegetatie ongemaaid van de zomer tot het einde van de zomer in het volgende jaar.
Zandwolfsmelk	Plant	De zandwolfsmelk groeit op grasland, rivierdijken en hellingen, in bermen en rivierduinen en langs spoorwegen.	Voer in het gebied waar de zandwolfsmelk voorkomt zo min mogelijk werkzaamheden uit. Bijvoorbeeld door het onderhoud te beperken. Voorkom dichtgroeien, bijvoorbeeld door begrazing.
Zanglijster	Vogel	De zanglijster leeft en broedt in bossen en bosjes met struiken maar komt ook in tuinen en parken voor.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de zanglijster is dat van half maart (soms begin maart) tot eind juli. Dan zijn nesten beschermd.
Zeearend	Vogel	De zeearend leeft vooral in grote moerasgebieden met oud bos. De zeearend broedt in grote stevige bomen.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Deze periode loopt van half februari (soms begin februari) tot half juli (soms eind juli). In Limburg zijn nesten in het broedseizoen beschermd. In Overijssel, Drenthe en Friesland zijn ze jaarrond beschermd. In de andere provincies ook, tenzij in de omgeving voldoende geschikte plekken zijn om een nieuw nest te bouwen. Om dat vast te stellen is vaak vooraf extra onderzoek nodig. Kijk voor de regels over jaarrond beschermde nesten in de Omgevingsverordening van de provincie.
Zeggekorfslak	Andere diersoort dan vogels of zoogdieren	De zeggekorfslak is een slak en leeft in oeverzones, moerassen en broekbossen, mits er moeraszegge voorkomt.	Maai gefaseerd zodat er altijd moeraszegge staat in het gebied waar de zeggekorfslak leeft.
Zilveren maan	Andere diersoort dan vogels of zoogdieren	De zilveren maan is een vlinder en leeft in natte hooi- of rietlanden met viooltjes.	Voorkom verdroging en verruiging in het gebied waar de zilveren maan leeft.
Zilveren zandbij	Andere diersoort dan vogels of zoogdieren	De zilveren zandbij is een insect en leeft in droog zandig gebied. Vooral in de duinen, maar ook in droge heideterreinen en zandverstuivingen.	Maai, plag of brand gefaseerd en zo laat mogelijk in het gebied waar de zilveren zandbij leeft. Ga vergrassing tegen en zorg voor open zandgrond om te kunnen nestelen.

Zilvermeeuw	Vogel	De zilvermeeuw leeft vooral in duinen en op strandvlaktes, kwelders, schorren en dijken. Ook op grasland met veel water komen ze steeds vaker voor. De zilvermeeuw broedt in kolonies in duinen, op kwelders en op platte daken.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de zilvermeeuw is dat van april tot half augustus. Dan zijn nesten beschermd. De zilvermeeuw broedt vaak op hetzelfde nest of in de directe omgeving. In Friesland geldt daarom een uitzondering. Hier mogen deze nesten nooit weggehaald worden, tenzij in de omgeving voldoende geschikte plekken zijn om een nieuw nest te bouwen. Om dat vast te stellen is vaak vooraf extra onderzoek nodig.
Zinkviooltje	Plant	Het zinkviooltje groeit in graslanden met veel zink in de grond.	Voer in het gebied waar het zinkviooltje voorkomt zo min mogelijk werkzaamheden uit. Bijvoorbeeld door het onderhoud te beperken. Strooi geen kalk, voorkom bemesting en ga afname van zink in de bodem tegen.
Zomertaling	Vogel	De zomertaling leeft en broedt in gebieden met plassen waar riet omheen staat, in moerassen, op ondergelopen land en op natte graslanden met veel sloten.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de zomertaling is dat van half maart tot eind juli. Dan zijn nesten beschermd.
Zomertortel	Vogel	De zomertortel leeft in gebieden met bosjes en struiken en vindt zijn eten vaak op bouwland. De zomertortel broedt in bossen, struiken en houtwallen.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de zomertortel is dat van mei tot half september. Dan zijn nesten beschermd. In Overijssel en Limburg zijn nesten jaarrond beschermd, maar mogelijk zijn er uitzonderingen. Kijk voor de regels over jaarrond beschermde nesten in de Omgevingsverordening van de provincie.
Zwarte kraai	Vogel	De zwarte kraai leeft en broedt in allerlei gebieden zoals op akkers en weiden, in bossen en parken maar ook in steden.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de zwarte kraai is dat van maart tot half juli. Dan zijn nesten beschermd. De zwarte kraai broedt vaak op hetzelfde nest of in de directe omgeving. In Noord-Brabant, Zuid-Holland, Noord-Holland, Zeeland, Gelderland en Utrecht geldt daarom een uitzondering. Hier mogen deze nesten nooit weggehaald worden, tenzij in de omgeving voldoende geschikte plekken zijn om een nieuw nest te bouwen. Om dat vast te stellen is vaak vooraf extra onderzoek nodig.

Zwarte mees	Vogel	De zwarte mees leeft en broedt vooral in naald- en gemengde bossen, maar ook wel in parken met naaldbomen.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de zwarte mees is dat van half maart tot half juli (soms eind juli). Dan zijn nesten beschermd. De zwarte mees broedt vaak op hetzelfde nest. In Overijssel, Noord-Brabant, Zuid-Holland, Noord-Holland, Zeeland, Gelderland en Utrecht geldt daarom een uitzondering. Hier mogen deze nesten nooit weggehaald worden, tenzij in de omgeving voldoende geschikte plekken zijn om een nieuw nest te bouwen. Om dat vast te stellen is vaak vooraf extra onderzoek nodig.
Zwarte roodstaart	Vogel	De zwarte roodstaart leeft onder andere in steden, industriegebieden en op (moderne) boerderijen. De zwarte roodstaart broedt in holtes van muren van gebouwen.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de zwarte roodstaart is dat van april tot half september. Dan zijn nesten beschermd. De zwarte roodstaart broedt vaak op hetzelfde nest. In Overijssel, Noord-Brabant, Zuid-Holland, Noord-Holland, Zeeland, Gelderland en Utrecht geldt daarom een uitzondering. Hier mogen deze nesten nooit weggehaald worden, tenzij in de omgeving voldoende geschikte plekken zijn om een nieuw nest te bouwen. Om dat vast te stellen is vaak vooraf extra onderzoek nodig.
Zwarte sachembij	Andere diersoort dan vogels of zoogdieren	De zwarte sachembij is een insect en leeft in groeven, ruderaal terrein en zonnige bosranden.	Maai niet voor juli of anders gefaseerd in het gebied waar de zwarte sachembij leeft. Behoud of creëer nestplekken in leemwanden en/of kale plekken op vlakke grond door dichtgroei te voorkomen.
Zwarte specht	Vogel	De zwarte specht leeft en broedt vooral in gemengde bossen en naaldbossen. Voor het maken van een nest gebruiken ze vaak een oude beuk. Zijn voedsel zoekt de zwarte specht meestal in naaldbossen.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de zwarte specht is dat van half maart (soms begin maart) tot eind juni (soms half juli). In Overijssel, Drenthe en Friesland zijn nesten jaarrond beschermd. In de andere provincies ook, maar mogelijk zijn er uitzonderingen. Kijk voor de regels over jaarrond beschermde nesten in de Omgevingsverordening van de provincie.

Zwarte stern	Vogel	De zwarte stern leeft en broedt in moerassen met ondiep water en in grasland met veel sloten met moerasplanten en modderbanken. De zwarte stern broedt in kolonies.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de zwarte stern is dat van eerste helft april tot eind juli (soms half augustus). Dan zijn nesten beschermd. In Drenthe en Friesland gelden uitzonderingen; daar zijn nesten jaarrond beschermd. Haal nesten van de zwarte stern in Drenthe en Friesland nooit weg.
Zwarte wouw	Vogel	De zwarte wouw leeft in de buurt van meren, plassen en rivieren. Ze broeden in dalen waar een rivier doorheen loopt. Zijn nest bouwt de zwarte wouw in een boom.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de zwarte wouw is dat van half maart tot eind augustus. De zwarte wouw komt ieder jaar terug naar hetzelfde nest. Daarom zijn nesten jaarrond beschermd. Haal nesten van de zwarte wouw nooit weg. In Flevoland zijn nesten jaarrond beschermd, tenzij in de omgeving voldoende geschikte plekken zijn om een nieuw nest te bouwen. Om dat vast te stellen is vaak vooraf extra onderzoek nodig.
Zwartkop	Vogel	De zwartkop leeft onder andere in loofbos, parken en grote tuinen. De zwartkop broedt vooral in bos met jonge bomen en struiken.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de zwartkop is dat van begin april tot eind juli (soms half augustus). Dan zijn nesten beschermd.
Zwartkopmeeuw	Vogel	De zwartkopmeeuw leeft vooral langs de kust. De zwartkopmeeuw broedt in kolonies in allerlei gebieden zoals recent aangelegde eilanden en fabrieksterreinen. Vaak broeden ze samen met kokmeeuwen.	Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de zwartkopmeeuw is dat van half april tot half augustus. Dan zijn nesten beschermd. In Friesland geldt een uitzondering, daar zijn de nesten van de zwartkopmeeuw jaarrond beschermd. Haal nesten van de zwartkopmeeuw in Friesland nooit weg.
Zwavelhaft	Andere diersoort dan vogels of zoogdieren	Heptagenia sulphurea is een insect en leeft in schone, stromende heuvellandrivieren met hout.	Zorg voor een goede waterkwaliteit in het gebied waar heptagenia sulphurea leeft.
Zweedse kornoelje	Plant	De Zweedse kornoelje groeit in open bossen en op vochtige heide.	Voer in het gebied waar zweedse kornoelje voorkomt zo min mogelijk werkzaamheden uit. Bijvoorbeeld door het onderhoud te beperken.